



HAITI 2002



Présentation

Indicateurs démographiques

Indicateurs socio-économiques

**Indicateurs de ressources, accès
et couverture**

Programme Elargi de Vaccination

Indicateurs de mortalité

Indicateurs de morbidité

Mortalité maternelle

Mortalité infantile



Présentation

PREFACE

Le Ministère de la Santé Publique et de la Population et l'Organisation Panaméricaine de la Santé sont heureux de vous présenter le second dépliant contenant les indicateurs de Base d'Haïti, pour l'année 2002.

Les indicateurs sélectionnés sont les indicateurs démographiques, socio-économiques, de ressources, accès et couverture, et de mortalité et morbidité les plus utilisés pour décrire la situation sanitaire de la population haïtienne.

Deux des sections de ce dépliant présentent l'information sur des problèmes prioritaires pour le MSPP: la mortalité maternelle et la mortalité infantile. L'information sur ces aspects de la mortalité provient de l'analyse des certificats de décès disponibles dans le pays qui, en dépit d'un sous-enregistrement important, définissent les principales causes de décès maternels et infantiles. Ces problèmes doivent être combattus avec la participation des secteurs public et privé, afin d'améliorer entre autres le contrôle prénatal pour éviter les complications dues à l'hypertension pendant la grossesse et l'accouchement, qui sont responsables de la moitié des décès maternels. Les soins institutionnels de l'accouchement, ainsi que la réponse rapide aux complications des nouveaux-nés pendant la période périnatale permettront d'améliorer ces indicateurs.

Nous voudrions exprimer notre gratitude aux personnes et institutions qui ont contribué à la préparation de ce dépliant, et spécialement aux cadres du MSPP dont les efforts permettent la mise en place progressive d'un système d'information basé sur la surveillance épidémiologique et l'analyse des certificats de décès. Nous remercions également les programmes de santé qui mettent en place les interventions nationales pour contrôler les maladies immunocontrôlables et les autres maladies prioritaires comme le VIH/SIDA et la tuberculose.

La diffusion de ce dépliant servira à tous les travailleurs de santé d'Haïti, pour améliorer l'état de santé de notre pays.

Dr. Henri-Claude Voltaire
Ministre de la Santé Publique
et de la Population

Dra. Lea Guido
Représentant OPS-OMS



HAITI 2002

Indicateurs démographiques





Démographiques

Indicateurs démographiques	Superficie	Population totale	Densité de population	Nombre de naissances (1)	Taux global de fécondité	Nombre de décès (2)
	Km2	6/30/00	Hab/Km2	estimé	Enfants par Femme	estimé
Source		IHSI	IHSI	IHSI	EMMUS III	IHSI
Année		2000	2000	2000	2000	2000
HAÏTI	27 700	7 958 964	287	260 254	4,7	76 405
Artibonite	4 983	1 110 450	223	36311	4,6	10 660
Centre	3 674	533 647	145	17450	7,6	5 123
Grand'Anse	3 309	687 645	208	22485	5,6	6 601
Nord	2 105	824 136	392	26949	4,5	7 912
Nord-Est	1 804	265 298	147	8675	5,3	2 547
Nord-Ouest	2 175	468 520	215	15320	5,4	4 498
Ouest	4 834	2 892 856	598	94596	3,2 (*)	27 771
Sud	2 793	696 178	249	22765	5,9	6 683
Sud-Est	2 023	480 234	237	15703	6,0	4 610

IHSI: Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique

EMMUS: Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services. IHE,2000

(*) Aire métropolitaine



Démographiques

Indicateurs démographiques	Taux de Croissance	Population urbaine	Population moins de 15 ans	Population 65 ans et plus	Ratio de Dépendance (3)
	%	%	%	%	p .100 hab.
Source	IHSI	IHSI	IHSI	IHSI	
Année	2000-2005	2000	2000	2000	2000
HAÏTI	2,08	35,6	39,9	3,8	77,6
Artibonite	1,82	25,0	42,6	4,0	87,3
Centre	1,67	15,6	43,9	4,0	91,8
Grand'Anse	1,39	13,4	41,8	4,5	86,0
Nord	1,64	29,0	43,9	3,7	90,8
Nord-Est	1,28	26,0	42,9	4,2	89,0
Nord-Ouest	2,15	15,0	45,7	4,7	101,6
Ouest	2,96	64,2	34,7	3,1	60,8
Sud	1,26	15,0	41,8	4,3	85,8
Sud-Est	0,98	8,9	40,7	5,0	83,9

Indicateurs démographiques	Taux de natalité	Taux de migration nette	Taux brut de mortalité	Espérance de vie		
				Total	Hommes	Femmes
	p. 1000 Hab.	%	p. 1000 Hab.	Années	Années	Années
Source	IHSI	IHSI	IHSI	IHSI		
Année	2000-2005	2000-2005	2000-2005	1995-2000		
HAÏTI	32,7	(-2,3)	9,6	54,4	52,8	56

(1) Nombre de Naissances: Estimé pour les départements à partir du taux brut de natalité national (32,7 pour mille)

(2) Nombre de décès: Estimé pour les départements à partir du taux brut de mortalité national (9,6 pour mille)

(3) Ratio de Dépendance: Exprime le nombre moyen de personnes théoriquement dépendantes

(moins de 15 ans et 65 ans et plus) pour 100 personnes en age productif (15 à 64 ans)



Démographiques




Pyramide de la population Haïti 2000

Population urbaine

Population rurale

Groupes d'âge

- 80+
- 75-79
- 70-74
- 65-69
- 60-64
- 55-59
- 50-54
- 45-49
- 40-44
- 35-39
- 30-34
- 25-29
- 20-24
- 15-19
- 10-14
- 5-9
- 0-4



Hommes
 Femmes



HAITI 2002

- **Indicateurs socio-economiques**





Indicateurs socio-economiques

Indicateurs socio-économiques	Population avec accès à:		Pauvreté (6)		Budget MSPP
	Eau potable (4)	Electricité (5)	Pauvreté	Extrême pauv.	par habitant
	%	%	%	%	Gourdes
Source	OPS/OMS	CERA	CERA		ASIS MSPP/OPS
Année	2000	1998	1998	1998	1997
HAÏTI	45	48,8	64,6	18,5	54,6
Artibonite	51	22,8	68,5	18,5	25,5
Centre	63	25,2	66,1	33,0	26,6
Grand'Anse	38	9,5	54,0	44,4	32,0
Nord	49	46,1	50,9	25,7	49,6
Nord-Est	28	25,8	85,5	12,9	38,2
Nord-Ouest	32	17,5	68,0	29,9	28,3
Ouest	33	73,4	60,1	4,4	63,9
Sud	42	35,2	76,0	12,8	41,3
Sud-Est	38	24,5	80,2	15,1	31,5
CERA: Centre de Recherche Appliquée					



Indicateurs socio-économiques

Indicateurs socio-économiques	Alphabétisation	Alphabétisation	Malnutrition, moins de 5 ans (%)		
	féminin (7)	masculine (7)	Globale (poids/âge)	Aigue (poids/taille)	Chronique (taille/âge)
	%	%			
Source	EMMUS III	EMMUS III	EMMUS III		
Année	2000	2000	2000	2000	2000
HAÏTI	58,7	69,9	17,3	4,5	22,7
Artibonite	39,1	66,7	19,2	3,6	25,9
Centre	46,3	55,6	17,0	2,2	32,7
Grand'Anse	48,9	61,0	19,8	4,8	25,8
Nord	54,2	59,7	18,6	4,8	24,4
Nord-Est	55,4	65,4	16,3	2,5	22,7
Nord-Ouest	50,8	62,4	16,5	4,5	21,6
Ouest	71,8	83,0	13,7	5,1	15,2
Sud	52,2	54,9	23,9	5,6	29,3
Sud-Est	48,8	59,0	20,5	6,9	24,7



Indicateurs socio-economiques

Indicateurs socio-économiques	Taux de scolarité primaire	Population avec accès à egout (%)	PIB
	%	villes secondaires	Per capita Gourdes
Source	Min. d'Education	OPS/OMS	IHSI
Année	1997	1999	1998-99
HAÏTI	56,2	27	8 555
(4) Pour les villages urbains. Situation du Secteur Approvisionnement en eau Potable (AEPA) 2000 Projet: CWS-OPS/OMS			
(5) Enquête "Projet de Marketing Social" Centre de Recherche Appliquée (CERA) 1998			
(6) Enquête "Projet de Marketing Social" Centre de Recherche Appliquée (CERA) 1998. Mesure de la pauvreté selon l'échelle "Amenities and Possessions Index (API)" de "Demographics and Health Surveys (DHS)"			
(7) Femmes et hommes de plus de 15 ans qui ne savent pas lire. EMMUS III 2000			



HAITI 2002

Indicateurs de ressources, accès et couverture





Indicateurs de ressources, accès et couverture

Indicateurs de ressources, accès et couverture	Professionnels de Santé			Nombre de professionnels de sante cubaines
	Médecins	Infirmières	Auxiliaires	
	p. 10,000 hab.			
Source	AMH	AOPS	AOPS	Coop. Cubaine
Année	1998	1996	1996	2000
HAÏTI	2,37	1,02	3,06	500
Artibonite	0,57	0,69	3,24	44
Centre	0,21	0,23	1,56	34
Grand'Anse	0,15	0,77	2,11	67
Nord	0,68	1,77	3,99	45
Nord-Est	0,42	1,22	3,28	77
Nord-Ouest	0,31	0,50	3,49	60
Ouest	5,82	1,25	3,01	78
Sud	0,55	1,32	4,74	38
Sud-Est	0,25	0,32	1,45	57
AMH: Association Médicale Haïtienne		AOPS: Association des Oeuvres Privées de Santé		



Indicateurs de ressources, accès et couverture

Indicateurs de ressources, accès et couverture	Nombre de lits	Services de Santé		
		Hôpitaux	Centres de santé	Dispensaires
	p. 1,000 hab.	Nombre		
Source	MSP-OPS	MSP - OPS/OMS ASIS 98		
Année	2000	1997	1997	1997
HAÏTI	0,81	49	217	371
Artibonite	0,51	4	27	53
Centre	0,38	2	12	30
Grand'Anse	0,61	2	15	38
Nord	0,94	1	21	31
Nord-Est	0,42	1	5	19
Nord-Ouest	0,55	3	9	49
Ouest	1,16	31	98	80
Sud	0,83	4	22	43
Sud-Est	0,35	1	8	28



Indicateurs de ressources, accès et couverture

Indicateurs de ressources, accès et couverture	Contrôle prénatal (8) par personnel formé	Assistance lors de l'accouchements par:		
		Médecin	Infirmières / Auxiliaires	Matrone
	%	%	%	%
Source	EMMUS III	EMMUS III	EMMUS III	EMMUS III
Année	2000	2000	2000	2000
HAÏTI	78,8	14,1	9,7	68,0
Artibonite	68,3	5,1	13,6	72,7
Centre	75,3	6,9	3,5	71,8
Grand'Anse	76,2	5,4	4,3	82,7
Nord	80,6	8,1	7,7	79,7
Nord-Est	84,6	6,6	9,1	79,1
Nord-Ouest	85,2	5,7	6,0	77,9
Ouest	84,1	28,5	13,6	51,9
Sud	77,3	5,4	4,8	78,8
Sud-Est	74,0	5,0	4,3	85,5



Indicateurs de ressources, accès et couverture

Indicateurs de ressources, accès et couverture	Accouchements a la maison	Usage de contraception toutes méthodes (9)	Usage de contraception méthodes modernes (10)
	%	%	%
Source	EMMUS III	EMMUS III	EMMUS III
Année	2000	2000	2000
HAÏTI	76,3	28,1	22,3
Artibonite	81,7	29,5	27,5
Centre	88,7	24,0	20,2
Grand'Anse	89,7	35,9	28,7
Nord	85,0	32,4	26,9
Nord-Est	85,5	29,8	20,6
Nord-Ouest	88,7	22,6	18,5
Ouest	57,9	27,1	19,6
Sud	90,5	29,6	24,5
Sud-Est	90,4	21,6	14,1
(8) Personnel formé: Médecins, Infirmières et Auxiliaires			
(9) Femmes actuellement en union			
(10) Méthodes modernes: pilule, injections, norplant, preservatif, stérilisation.			



HAITI 2002

Programme Elargi de Vaccination





Programme Elargi de Vaccination

Indicateurs de ressources, accès et couverture	Couverture Vaccinale			
	Polio 3	DPT 3	BCG	Rougeole
	moins d'1 an (%)			1 an (%)
Source	MSPP-PEV OPS/OMS			
Année	2001	2001	2001	2001
HAÏTI	39,7	39,0	37,3	39,4
Aire Metropolitaine	26,5	27,1	28,7	28,0
Artibonite	50,0	50,8	48,5	46,2
Centre	41,7	44,2	48,2	45,8
Grand'Anse	64,5	63,2	48,5	74,6
Nippes	28,9	27,6	35,0	22,3
Nord	56,2	56,9	41,8	67,5
Nord-Est	40,6	46,7	37,6	40,2
Nord-Ouest	29,5	26,8	24,9	36,1
Ouest	41,9	33,6	44,1	38,9
Sud	42,1	37,8	35,5	18,9
Sud-Est	25,0	27,4	19,5	26,9
DPT3: Vaccination troisieme dose contre la diphtérie, coqueluche et tétanos				
BCG: Bacille de Calmet et Guerin, vaccination pour la prevention de formes graves de tuberculose				




Programme Elargi de Vaccination

Indicateurs de ressources, accès et couverture	Campagna nationale de Vaccination			
	Antirougeleux 6 moins a 4 ans		Couverture antipolio 0 a 9 ans	
	MSP-PEV	OPS/OMS	MSP-PEV	OPS/OMS
Source	Population	Couverture (%)	Population	2 dose (%)
Année	2001	2001	2001	2001
HAÏTI	1 312 713	101	2 261 768	110
Aire Metropolitaine	375 760	80	559 017	96
Artibonite	149 990	111	315 368	124
Centre	87 871	121	151 556	131
Grand'Anse	76 428	96	119 524	92
Nippes	26 533	145	64 839	129
Nord	129 163	111	234 055	125
Nord-Est	33 761	131	75 345	147
Nord-Ouest	82 128	112	133 060	103
Ouest	159 391	114	262 555	126
Sud	122 222	80	210 063	88
Sud-Est	69 466	124	136 386	114



Programme Elargi de Vaccination





HAITI 2002

Indicateurs de mortalité



Indicateurs de mortalité

Indicateurs de mortalité	Décès avec certificat (11)	Signes et symptômes de décès mal définis	Mortalité infantile, moins d'1 ans			Mortalité, moins de 5 ans	
			Estimée	Estimée	Enregistrée	MDA* (A00-A09)	IRA* (J00-J22)
	%	% (R00-R99)	x1000 nv	Nombre	Nombre	% (décès enregistrés)	
Source	MSPP/OPS	MSPP/OPS	EMMUS III	MSPP/OPS	MSPP/OPS	MSPP- OPS/OMS	
Année	2000	2000	1995-2000	2000	2000	2000	2000
HAÏTI	12,08	41,44	80,3	20 899	814	11,5	9,4
Artibonite	7,73	8,50	87,8	3 188	145	7,2	14,4
Centre	5,91	34,98	104,9	1 831	27	14,0	12,0
Grand'Anse	9,85	28,62	67,2	1 511	65	26,2	21,3
Nord	13,51	33,12	72,2	1 946	186	4,8	5,2
Nord-Est	48,77	67,47	74,4	645	67	25,8	8,4
Nord-Ouest	6,29	27,92	72,8	1 115	47	15,4	5,1
Ouest	14,97	51,12	89,8	8 495	169	6,3	4,7
Sud	5,94	5,54	91,9	2 092	64	10,7	14,3
Sud-Est	6,66	14,98	90,4	1 420	44	9,9	9,9

(11): Pourcentage des décès qui présentent un certificat par rapport au nombre estimé de décès

(*): MDA: Maladies diarrhéiques aiguës, IRA: Infections respiratoires aiguës



Indicateurs de mortalité

Indicateurs de mortalité	Nombre de décès enregistrés pour						
	Mal. Infectieuses (A00-B99)	Sida (B20-B24)	Malaria (B50-B54)	F. Typhoïde (A01)	Tuberculose (A15-A19)	Diarrhée (12) (A09)	Septicémies (A41)
Source	MSPP - OPS/OMS						
Année	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
HAÏTI	1 532	471	78	101	255	440	79
Artibonite	244	114	16	15	33	27	19
Centre	87	18	3	8	40	14	0
Grand'Anse	140	18	21	3	17	68	1
Nord	221	134	5	8	32	20	5
Nord-Est	156	5	7	4	11	126	2
Nord-Ouest	65	18	2	11	8	14	5
Ouest	433	111	12	40	89	129	32
Sud	108	34	5	4	9	24	11
Sud-Est	78	19	7	8	16	18	4

12: Diarrhée et gastro-entérite d'origine présumée infectieuse



Indicateurs de mortalité

Indicateurs de mortalité	Nombre de décès enregistrés pour						
	Mort. Maternelle (O00-O99)	Diabète (E10-E14)	Malnutrition (E40-E46)	Tumeurs (C00-D48)	Mal. app. Circul. (I00-I99)	Hypertension (I10-I15)	MCV (13) (I60-I69)
Source	MSPP- OPS/OMS						
Année	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
HAÏTI	216	188	261	326	948	210	407
Artibonite	32	23	25	28	122	26	57
Centre	17	1	19	2	18	4	5
Grand'Anse	24	13	20	25	98	15	53
Nord	15	30	40	30	97	15	63
Nord-Est	16	6	12	6	85	54	4
Nord-Ouest	11	3	10	5	29	7	15
Ouest	68	99	91	194	388	71	157
Sud	22	6	13	25	61	7	33
Sud-Est	11	7	31	11	50	11	20
(13) MCV: Maladies Cérébrovasculaires							



Indicateurs de mortalité

Indicateurs de mortalité	Nombre de décès enregistrés pour			
	Causes externes (S00-Y98)	Homicide (X85-Y09)	Suicide (X60-X84)	Acc. Transport (V01-V99)
Source	MSPP - OPS/OMS			
Année	2000	2000	2000	2000
HAÏTI	541	178	8	124
Artibonite	56	5		4
Centre	7			
Grand'Anse	30	3	3	4
Nord	37	3	1	4
Nord-Est	27	9		6
Nord-Ouest	11			2
Ouest	337	158	4	97
Sud	22			1
Sud-Est	14			6



HAITI 2002

Indicateurs de morbidité



Indicateurs de morbidité

Indicateurs de morbidité	Cas d'Infection respiratoire aigue (IRA)	Cas de Maladie diarréica aigue (MDA)	Rougeole (cas)		Paralyisie Flasque Aigue (PFA) Cas	Poliovirus Sabin-1 Mutant	Difterie Cas	Coqueluche Cas	Tétanos Néonatal
			Notifié	Confirmés					Cas
Source	MSPP/ Cop. Cubaine		MSPP		MSPP		MSPP		
Année	2000	2000	2000		2000		2000	2000	2000
HAÏTI	74 962	39 085	1 177	990	15	1	2	84	37
Artibonite	7 696	3363	264	243	1				
Centre	3 289	1311	36	13	2			33	1
Grand'Anse	12 776	4443	13	5			2	34	18
Nord	6 800	3064	31	28	1				
Nord-Est	15 025	13 928	3	2				11	
Nord-Ouest	8 206	3269	25	13	6	1			
Ouest	7 412	2852	769	676	5				
Sud	3 709	2266	16	4				6	18
Sud-Est	10 049	4589	20	6					

IRA: Infections respiratoires aigues. MDA: Maladies diarrhéiques aigues. PFA: Paralyisie flasque aigue



Indicateurs de morbidité

Indicateurs de morbidité	Rage Humaine	Charbon Humaine	Dengue Classique		Malaria à <i>P. falciparum</i>	
	Cas	Cas	Cas	Taux p. 100,000	Cas	Taux p. 100,000
Source	MSP	MSP	MSP/ Cop. Cubaine		MSP/ Cop. Cubaine	
Année	2000	2000	2000	2000	2000	2000
HAÏTI	3	43	57	0,72	16 897	212,3
Artibonite		30	1	0,09	1078	97,1
Centre					487	91,3
Grand'Anse			40	5,82	3 148	457,8
Nord					769	93,3
Nord-Est		1			4 086	1 540,2
Nord-Ouest			14	2,99	2 171	463,4
Ouest	3		2	0,07	1 459	50,4
Sud		12			780	112,0
Sud-Est					2 919	607,8



Indicateurs de morbidité

Indicateurs de morbidité	Parasitisme Intestinale	Fievre Typhoïde	SIDA	ITS	Tuberculose			
	Cas	Cas	Cas	Cas	Cas DOTS	Cas Non DOTS	Total Cas	Taux p. 100,000
					MSP			
Source	MSP/ Cop. Cubaine		MSP/ Cop. Cubaine		MSP			
Année	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
HAÏTI	62 361	22 245	2 532	9 334	4 848	5 645	10 493	131,8
Artibonite	1 910	1 504	202	1 316	287	854	1 141	102,8
Centre	940	860	70	787	527	53	580	108,7
Grand'Anse	6 037	552	119	984	348	493	841	122,3
Nord	4 442	2 990	294	926	640	683	1 323	160,5
Nord-Est	37 777	9 664	993	1 049	212		212	79,9
Nord-Ouest	3 466	2 507	139	1 060		469	469	100,1
Ouest	2 917	1 879	232	1 356	2 763	1 808	4 571	158,0
Sud	1 850	815	366	448	71	694	765	109,9
Sud-Est	3 022	1 474	117	1 408		591	591	123,1



HAITI 2002

Mortalité maternelle



Mortalité maternelle

Indicateurs de mortalité	Nombre de décès enregistrés pour				
	Mort. Maternelle Tous les causes (O00-O99)	Avortement (O00-O08)	Hypertension (14) (O10-O16)	Complications (15) (O-60-O75)	Puerpéralité (16) (O85-O92)
Source	MSP - OPS/OMS				
Année	2000	2000	2000	2000	2000
HAÏTI	216	8	95	40	13
Artibonite	32		15	11	
Centre	17		9		1
Grand'Anse	24	3	3	6	5
Nord	15	1	8	2	1
Nord-Est	16		3	9	1
Nord-Ouest	11	2	6		
Ouest	68	2	32	6	3
Sud	22		13	4	1
Sud-Est	11		6	2	1
(14): Edème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité					
(15): Complications du travail et de l'accouchement					
(16): Complications principalement liées à la puerpéralité					



Mortalite maternelle

DIX PREMIERES CAUSES SPECIFIQUES DE DECES MATERNELLE

CERTIFICATS DE DECES. HAITI 2000

		CIM10	Total	%
1	Eclampsie	O15	76	35,2
2	Decollement premature du placenta	O45	21	9,7
	Autres complications du travail et de	O75	13	6,0
3	l'accouchement, non classees ailleurs			
4	Hemorragie du post partum	O72	12	5,6
	Mort de origine obstetricale de cause non precisée	O95	12	5,6
5				
	Hypertension gestacionnelle avec proteinurie	O14	12	5,6
6	important			
7	Autres traumatismes obstetricaux	O71	11	5,1
	Autres maladies de la mere compliquant la	O99	10	4,6
8	grossesse, l'accouchement et la puerperalité			
	Maladies infectieuses et parasitaires de la mère	O98	7	3,2
9	compliquant la grossesse, l'accouchement et la			
	puerperalité			
10	Complications puerperales, non classées ailleurs	O90	5	2,3
	Total dix premieres causes		179	82,9
	Reste de causes		37	17,1
	Total mortalite maternelle enregistree	O00-O99	216	100



Mortalité maternelle

Selon l'Enquête EMMUS III, le taux estimé de mortalité maternelle en l'an 2000 a été de 523 pour 100 000 naissances vivantes. Le nombre attendu de décès maternels est donc approximativement de 1 361. L'on a enregistré 216 décès maternels en l'an 2000, qui représentent 16% du total attendu et qui permet de conjecturer sur les principales causes de mortalité maternelle dans le pays. Près de la moitié des décès maternels (44%) sont dus à des problèmes liés à l'hypertension, la pré-éclampsie ou l'éclampsie, qui sont des problèmes qui pourraient être identifiés de manière opportune. Le MSPP a identifié la mortalité maternelle comme un problème prioritaire de santé publique et réalise des efforts pour améliorer le contrôle prénatal et les soins institutionnels des accouchements. Les stratégies pour la réduction des décès maternels sont basées sur:

- 1) L'amélioration de l'offre de services; au travers du renforcement institutionnel pour assurer la disponibilité des intrants et la réhabilitation des structures de soins; ainsi que l'amélioration de la compétence du personnel pour la prise en charge adéquate des femmes et la mise en place d'un système de référence et contre référence.
- 2) L'approche intra et extra-sectorielle; avec la coordination avec les programmes connexes (ITS-VIH-SIDA, nutrition, Santé Scolaire, Tuberculose et Maladies transmises par vecteurs, et la surveillance épidémiologique de la mortalité maternelle et la coordination avec les différents intervenants publics et privés.
- 3) Renforcement de la participation communautaire
- 4) Mobilisation des ressources nécessaires à la mise en oeuvre des activités



HAITI 2002

Mortalite infantile



Mortalite infantile

DIX PREMIERES CAUSES SPECIFIQUES DE DECES INFANTILE


CERTIFICATS DE DECES. HAITI 2000

	CIM 10	Femme	Hommes	Innc.	Total	%
1 Affections don't l'origine se situe dans la période périnatale	P00-P96	143	138	2	283	34,8
2 Grippe et pneumopathie	J10-J18	38	36		74	9,1
3 Malnutrition	E40-E46	32	35		67	8,2
4 Diarrhée et gastro-entérite infectieuse	A09	21	40		61	7,5
5 Mal. Inflammatoires du système nerveux central	G00-G09	15	23		38	4,7
6 Septicémie	A41	14	14		28	3,4
7 Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	Q00-Q99	12	12	1	25	3,1
8 Maladies due au VIH-SIDA	B20-B24	12	13		25	3,1
9 Tétanos néonatal	A33	4	14		18	2,2
10 Autres maladies de l'appareil respiratoire	J95-J99	4	8		12	1,5
Total dix premiers causes		295	333	3	631	77,5
Reste de causes avec diagnostique		47	48	1	96	11,8
Symptomes, signes et resultats anormaux non classés ailleurs	R00-R99	33	53	1	87	10,7
Total de certificat de deces enregistree		375	434	5	814	100



Mortalité infantile

Premières causes de décès perinatale. Mortalité infantile, 2000



Le taux de mortalité infantile estimé pour l'an 2000 a été de 80,3 pour 1 000 naissances vivantes. Selon les 814 certificats de décès enregistrés en l'an 2000, 35% ont lieu pendant la période périnatale, et le tiers de ces décès néonataux sont dus aux maladies infectieuses.

Les problèmes respiratoires aigus et les diarrhées sont les principales causes de décès infantile. L'on remarque que le VIH/SIDA se trouve parmi les premières causes de décès, une situation qui traduit la prévalence élevée de l'infection dans la population en âge reproductif. Le Ministère a mis en place des efforts de développement de la stratégie PCIME (Prise en charge intégrée des maladies de l'enfance), et cherche également à atteindre des couvertures de vaccination optimales, à former le personnel de santé et à prévenir la transmission maternelle du VIH. Au niveau communal, l'on met la priorité sur la reconnaissance précoce des signes d'alerte pour des soins de santé opportuns.