

28 de diciembre de 2017

Cólera en las Américas – Resumen de la situación


En la Región de las Américas, entre las semanas epidemiológicas (SE) 1 y SE 50 de 2017 se notificaron 13.582 casos sospechosos de cólera en La Española; 99% de los cuales ocurrieron en Haití (13.468 casos; incluidas 157 defunciones)¹.

Si bien en ambos países se observó una disminución de casos respecto a lo notificado en 2016, la República Dominicana registró la mayor variación disminuyendo de 12,8 a 1,21 casos por cien mil habitantes mientras que en Haití la variación fue de 3,74 a 1,10 casos por cien mil habitantes en 2016 y 2017, respectivamente.

En **Haití**, los casos notificados entre la SE 1 y la SE 50 de 2017 (13.468) representan una disminución del 68% respecto al total de casos notificados desde la SE 1 a la SE 52 de 2016 (41.421) y es el número de casos más bajo registrado desde el inicio del brote en octubre de 2010 (**Figura 1**). Aún así, se notifican 200-300 casos sospechosos cada semana. En la SE 47 y la SE 50, se informaron casos sospechosos en 7 de los 10 departamentos, aunque cuatro departamentos (Artibonite, Centre, Nord Ouest y Ouest) concentraron el 90% de los casos. El promedio de casos notificados en este periodo superó a lo observado en semanas anteriores, principalmente a expensas de los departamentos Nord y Nord Ouest donde se observó un aumento de 36% y 19%, respectivamente.

De manera similar, comparativamente entre 2016 y 2017 el número de defunciones relacionadas con el cólera disminuyó en 65% (de 447 a 157 defunciones) y el número de defunciones notificados en 2017, corresponde a la cifra más baja registrada desde 2010.

Figura 1. Número de casos sospechosos de cólera por semana epidemiológica. Haití, 2014-2017 (hasta la SE 50)



Fuente: Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) de Haití/ Direction d'Epidémiologie de Laboratoire et de Recherches (DELR)

¹ Datos preliminares publicados por el Ministerio de Salud Pública y de la población de Haití. Disponible en: <http://mspp.gouv.ht/site/downloads/Profil%20statistique%20Cholera%2050eme%20SE2017complet%20.pdf>

En la **República Dominicana** entre la SE 1 y la SE 50 de 2017, se notificaron 119 casos sospechosos de cólera lo que representa una disminución de 90% comparado con lo notificado en 2016 (1.149 casos entre la SE 1 y la SE 52); situación similar con respecto al número de defunciones donde el descenso observado fue de 85%.

En la **Tabla 1** se muestra el número de casos notificados de cólera entre octubre de 2010 y diciembre de 2017 en La Española.

Tabla 1: Número de casos sospechosos de cólera en La Española, octubre de 2010 - diciembre de 2017

Año	República Dominicana			Haití		
	Casos	Defunciones	Tasa de letalidad (%)	Casos	Defunciones	Tasa de letalidad (%)
2010 [†]	191	0	0	179.379	3.990	2,2
2011 [†]	20.851	336	1,6	340.311	2.869	0,8
2012 [†]	7.919	68	0,8	112.076	894	0,8
2013 [†]	1.954	42	2,1	58.809	593	1,0
2014 [†]	603	11	1,8	27.753	296	1,1
2015	546	15	2,7	36.045	322	0,9
2016	1.159*	27*	2,3	41.421 *	447*	1,1
2017	119**	4**	3,4	13.468***	157***	1,2

[†] **Fuente:** Boletín Epidemiológico Semanal de la OMS. Disponible en: <http://www.who.int/cholera/statistics/en/>

*Datos hasta la SE 52 de 2016

**Datos hasta la SE 50 de 2017. Publicados por el Ministerio de Salud Pública, Dirección General de Epidemiología de la República Dominicana.

***Datos hasta la SE 50 de 2017; publicados por el Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) de Haití/ Direction d'Epidémiologie de Laboratoire et de Recherches (DELR).

Orientaciones para los Estados Miembros

A pesar de que se registra la incidencia mas baja desde octubre de 2010, la transmisión de cólera continúa en La Española. Por ello, la OPS/OMS mantiene su recomendación a los Estados Miembros sobre la necesidad de mantener y fortalecer la capacidad de vigilancia del cólera a fin de detectar precozmente los casos sospechosos, proporcionar el tratamiento adecuado y prevenir su propagación. El tratamiento precoz y adecuado mantiene la tasa de letalidad de los pacientes hospitalizados en cifras menores a 1%.

La OPS/OMS alienta a los Estados Miembros a que continúen con sus esfuerzos, incluido la promoción de higiene y movilización social, para garantizar condiciones adecuadas de saneamiento básico y acceso al agua potable con el fin de reducir el impacto del cólera y otras enfermedades transmitidas por el agua.

Referencias

1. Boletín Epidemiológico Semanal, Semana Epidemiológica 50, 2017. Ministerio de Salud Pública de República Dominicana. Disponible en: <http://bit.ly/2lhhp7X>
2. Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) de Haïti/ Direction d'Epidémiologie de Laboratoire et de Recherches (DELR). Disponibles en: <http://bit.ly/2zDbgbe>

Enlaces de utilidad:

- Boletín Epidemiológico Semanal. Informe Anual de cólera de 2015. OMS Disponible en: <http://apps.who.int/iris/handle/10665/250142>
- Información sobre cólera de la OMS. Disponible en: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs107/es/index.html>
- Temas de salud de la OPS: Cólera. Disponible en: www.paho.org/colera
- Información sobre la declaración de la OMS en relación con los viajes y el comercio internacional hacia y desde los países que están registrando cólera: <http://www.who.int/cholera/technical/prevention/cholera-travel-and-trade-advice-231110.pdf>
- Atlas de cólera en la Española. OPS/OMS. Disponible en http://new.paho.org/hq/images/Atlas_IHR/CholeraHispaniola/atlas.html
- Brotes epidémicos de cólera: evaluar la respuesta y mejorar la preparación http://www.who.int/topics/cholera/publications/cholera_outbreak/es/
- Recomendaciones para el manejo clínico de cólera http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=1170&gid=10815&lang=es