

Programa Ampliado de Inmunizaciones

# POLÍTICA DE FRASCOS ABIERTOS MULTIDOSIS

para vacunas precalificadas por la OMS

Hasta  
**28 días**  
después de abrir el frasco

- IPV •bOPV
- DPT •TT •DT •Td
- Hepatitis B •Influenza
- Varicela (verificar presentación/proveedor)
- Formulas líquidas de vacuna contra la Hib



Hasta  
**6 horas**

después de haber sido reconstituidas

- BCG •SR •SRP
- Fiebre amarilla
- Varicela (verificar presentación/proveedor)
- Formulas liofilizadas de vacuna contra la Hib

## ACCIONES QUE SE DEBEN REALIZAR:

-  Utilizar antes de la fecha de vencimiento
-  Escribir en el frasco la fecha y hora de apertura
-  Almacenar y transportar entre +2°C y + 8°C
-  Manipular con buenas prácticas asépticas
-  Leer las instrucciones y recomendaciones del fabricante y los lineamientos nacionales

## ATENCIÓN:



No utilizar si el tapón del frasco fue sumergido en el agua del deshielo de los paquetes fríos



Prohibido dejar agujas introducidas en el tapón del frasco



No precargar las jeringas con vacunas

## RECOMENDACIÓN

Durante el fin de semana o en preparación a un corte de electricidad, emergencias u otros eventos que puedan afectar la conservación de la cadena de frío, se debe:

- Acondicionar adecuadamente los paquetes fríos y colocarlos dentro del termo
- Empacar y conservar las vacunas en los termos
- Colocar un termómetro dentro del termo
- Ubicar el termo dentro del refrigerador



Organización Panamericana de la Salud



Organización Mundial de la Salud  
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

Expanded Program on Immunization

# MULTI-DOSE OPEN VIAL POLICY

for WHO prequalified vaccines

Liquid vaccines  
Up to  
**28 days**  
After opening the vial

- IPV •bOPV
- DPT •TT •DT •Td
- Hepatitis B •Influenza
- Varicela (verify presentation/provider)
- Liquid forms of the Hib vaccine



Lyophilized vaccines  
Up to  
**6 hours**  
After they are reconstituted

- BCG •MR •MMR
- Yellow Fever
- Varicela (verify presentation/provider)
- Lyophilized forms of Hib vaccine

## ACTIONS THAT SHOULD BE TAKEN:

-  Use before expiration date
-  Write on the vial the date and hour it is opened
-  Store and transport between +2°C and +8°C
-  Maintain good hygiene and vaccine handling practices
-  Read the instructions and recommendations of the provider and the national guidelines

## CAUTION:



Do not use if the vial stopper has been submerged in water from leaking cold-packs



Do not leave needles in the vaccine vial stopper



Do not prefill syringes with the vaccines

## RECOMMENDATION:

During the weekend or in preparation for electricity outages, emergency, or another event that could affect the cold chain storage, you should:

- Adequately prepare cold-packs and put them in thermos
- Pack and store the vaccines in a thermos
  - Put a thermometer in the thermos
  - Place the thermos in the refrigerator



Pan American  
Health  
Organization



World Health  
Organization  
REGIONAL OFFICE FOR THE Americas

# POLITIQUE DE VIAL MULTI-DOSE ENTAMÉS

Pour vaccins pré-qualifiés par l'OMS

Vaccins liquides  
Jusqu'à

**28 jours**

Après l'ouverture  
du flacon

- IPV •bOPV
- DTP •TT •DT •Td
- Hépatite B •Influenza
- Varicelle (Vérifier la présentation/fournisseur)
- Formules liquides pour vaccins contre Hib



Vaccins lyophilisés  
Jusqu'à

**6 heures**

Après avoir été reconstitués

- BCG •Fièvre jaune •RR
- Fièvre jaune
- Varicelle (Vérifier la présentation/fournisseur)
- Formule lyophilisé du vaccin contre Hib

## LES ACTIONS À RÉALISER



Utiliser avant la date d'expiration



Ecrire la date et l'heure d'ouverture  
du vial



Stocker et transporter entre +2 °C et  
+8 °C



Manipuler en tenant compte de  
pratiques aseptiques adéquates



Lire les instructions et recommanda-  
tions du fabricant



Ne pas utiliser si le capuchon de  
la bouteille a été submergé dans  
l'eau des accumulateurs de froid



Il est interdit de laisser une  
aiguille insérée dans le bouchon  
de la bouteille



Il est interdit de pré-charger les  
seringues avec des vaccins

## RECOMMANDATION:

Pendant la fin de semaine ou en cas de panne de courant, d'urgence ou d'autres événements qui pourraient affectés la chaîne froide, vous devez:

- Conditionner les paquets froids correctement et les placer à l'intérieur du thermos
- Emballer et conserver les vaccins dans les thermos.
  - Placer un thermomètre à l'intérieur du thermos
  - Placer le thermos dans le réfrigérateur



Organisation  
panaméricaine  
de la Santé



Organisation  
mondiale de la Santé  
Amériques

BUREAU RÉGIONAL DES