

Departamento de ITS, Sida y Hepatitis Virales

- Consulta Regional sobre Información Estratégica en VIH en el Sector de la Salud en América Latina y el Caribe

Panamá 2012

Datos maternoinfantiles sobre VIH y sífilis

Brasil



Panamá 2012

Los datos se obtuvieron a partir de los sistemas de información oficiales y estudios especiales

Evolución de la epidemia de sida en Brasil

- Estimación de infectados por el VIH: **630 000**
- Prevalencia de la infección por el VIH*:
0,61 %

Femenino **0,41 %**

Masculino **0,82 %**

*: Población de 15 a 49 años.

Aids: informações gerais⁽¹⁾

Casos acumulados (até 06/2011): **608.230**

2009 – 35.979

2010 – 34.212

Taxa de incidência (por 100 mil habitantes)

2009 – 18.8

2010 – 17.9

Nº óbitos acumulados (1980-2010): 241.469

2009 – 12.097

2010 – 11.965

Coeficiente de mortalidade (por 100 mil habitantes)

2009 – 6,3

2010 – 6,3


Fonte: MMS/S/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais

(1) Casos notificados no SINAN e registrados no SISCEL/SICLOM até 30/06/2011 e declarados no SIM de 2000 a 2010

Dados preliminares

Evolución de la epidemia de sida en Brasil

Tasa de incidencia de sida⁽¹⁾ (por 100 000 hab.), según región de residencia y año de diagnóstico. Brasil, 1998 a 2010




FUENTE: MS/SVS/Departamento de ITS, Sida y Hepatitis Virales

(1) Casos notificados al SINAN y registrados en el SISCEL/SICLOM hasta el 30/06/2011 y en el SIM de 2000 a 2010


Datos preliminares

Evolución de la epidemia de sida en Brasil

Tasa de incidencia de casos de sida ⁽¹⁾ según grupo de edad y sexo.
Brasil, 2000



Tasa de incidencia de casos de sida ⁽¹⁾ según grupo de edad y sexo.
Brasil, 2010



Masculino Femenino

FUENTE: MS/SVS/Departamento de ITS, Sida y Hepatitis Virales

POBLACIÓN: MS/SE/DATASUS, en <[www.datasus.gov.br/informações em salud](http://www.datasus.gov.br/informações%20em%20saúde)> Consultado el 21/11/2011

(1) Casos notificados al SINAN y registrados en el SISCEL/SICLOM hasta el 30/06/2011 y en el SIM de 2000 a 2010

Datos preliminares de los últimos 5 años

No Brasil são de notificação compulsória:

- Sífilis congênita - Portaria n.º 542, de 22/12/1986
- Gestantes HIV + e Crianças exposta – Portaria n.º 993, de 04 de setembro de 2000
- Sífilis em gestantes – Portaria n.º 33, de 14 de julho de 2005


Tasa de prevalencia (%) de parturientas seropositivas, estimación de parturientas y nacidos vivos seropositivos según región. Brasil, 2004*

Región	Prevalencia (%)*	Parturienta en 2004 **	Parturienta seropositiva	Nacidos vivos seropositivos
Norte	0,152	301.208	458	69
Nordeste	0,225	929.717	2.092	227
Sudeste	0,537	1.195.168	6.418	448
Sur	0,510	408.116	2.081	109
Centro-Oeste	0,425	227.193	966	54
Brasil	0,413	3.059.402	12.644	906

*Estudio Centinela Parturiente, 2004. **Estimación Basada en el número de nacidos vivos (SINASC). - Tasa estimada de transmisión del VIH: Norte 14,9 %, Nordeste 11,3 %, Sudeste 7,5 %, Sur 5,5 %, Centro-Oeste 5,6 %

Situación de la transmisión vertical del VIH


Tasa de transmisión vertical (%) del VIH, por año de nacimiento, Brasil, 1997 a 2004



FUENTE: Tess, 1998; Succi, 2007

Situación de la transmisión vertical del VIH

Coeficiente de detección del VIH en embarazadas, según región y año de diagnóstico. Brasil, 2000 a 2010.



FUENTE: MS/SVS/Departamento de ITS, Sida y Hepatitis Virales


POBLACIÓN: MS/SE/DATASUS, en <[www.datasus.gov.br/informações em saúde](http://www.datasus.gov.br/informações%20em%20saúde)> Consultado el 21/11/2011

(1) Casos notificados al SINAN y registrados en el SISCEL/SICLOM hasta el 30/06/2011 y en el SIM de 2000 a 2010

Datos preliminares de los últimos 5 años

Situación de la transmisión vertical del VIH

Porcentaje de casos de sida en menores de cinco años notificados al SINAN. Brasil, 1980-2011⁽¹⁾




Fuente: MS/SVS/Departamento de ITS, Sida y Hepatitis Virales

Nota: (1) Casos notificados al SINAN hasta el 30/06/2011

Situación de la transmisión vertical del VIH

Tasa de incidencia del sida⁽¹⁾ (por 100 000 hab.) en menores de cinco años, según región de residencia por año de diagnóstico. Brasil, 1998 a 2010



FUENTE: MS/SVS/Departamento de ITS, Sida y Hepatitis Virales

POBLACIÓN: MS/SE/DATASUS, en <[www.datasus.gov.br/informações em salud](http://www.datasus.gov.br/informações%20em%20saúde)> Consultado el 21/11/2011

(1) Casos notificados al SINAN y registrados en el SISCEL/SICLOM hasta el 30/06/2011 y en el SIM de 2000 a 2010

Datos preliminares de los últimos 5 años

Tasa de prevalencia (%) de parturientas y nacidos vivos con sífilis según región. Brasil, 2004

Región	Prevalencia* (%)	Parturientas** en 2002	Parturientas con sífilis	Nacidos vivos con Sífilis***
Norte	1,8	301.208	5.422	1.355
Nordeste	1,9	929.717	17.665	4.416
Sudeste	1,6	1.195.168	19.123	4.781
Sur	1,4	406.116	5.686	1.421
Centro-Oeste	1,3	227.193	2.954	738
Brasil	1,6	3.059.402	48.950	12.238

*Estudio Centinela Parturiente, 2004. **Calculado por los nacidos vivos. *** Tasa estimada de transmisión de la sífilis de 25 %

Sífilis en gestantes

- **7200** casos por año
- **5,0** casos/1000 nacidos vivos en 2011
- **57 700** casos entre 2005 y 2012¹

Sífilis congénita


- **5400** casos por año
- **3,3** casos/1000 nacidos vivos en 2011
- **81 059** casos entre 1998 y 2012¹

Fuente: MS/SVS/Departamento de ITS, Sida y Hepatitis Virales e IBGE.

Nota: (1) (1) Casos notificados al SINAN hasta el 30/06/2012. Datos preliminares.

Situación de la transmisión vertical de la sífilis

Tasa de detección de la sífilis en mujeres embarazadas (por cada 1000 nacidos vivos) por región y año de notificación. Brasil, 2005 a 2011⁽¹⁾




Fuente: MS/SVS/Departamento de ITS, Sida y Hepatitis Virales e IBGE.

Nota: (1) Casos notificados al SINAN hasta el 30/06/2012. Datos preliminares.

Situación de la transmisión vertical de la sífilis

Tasa de incidencia de sífilis congénita en menores de un año (por 1000 nacidos vivos), según región de residencia y año de diagnóstico. Brasil, 1998 a 2011⁽¹⁾




Fuente: MS/SVS/Departamento de ITS, Sida y Hepatitis Virales e IBGE.
Nota: (1) Casos notificados al SINAN hasta el 30/06/2012. Datos preliminares.

Tasa de incidencia (por 1000 nacidos vivos) de sífilis congénita en menores de 1 año por estado y año de diagnóstico. Brasil, 2007-2011⁽¹⁾

Estado de residencia	2007	2008	2009	2010	2011 ⁽²⁾
Rio de Janeiro	5.3	5.8	6.4	6.7	9.8
Ceará	3.4	4.2	4.9	5.2	6.8
Sergipe	2.7	3.1	3.5	5.0	6.7
Alagoas	4.2	3.2	3.3	4.0	5.9
Rio Grande do Norte	2.7	3.7	4.0	4.2	5.4
Pernambuco	4.2	2.7	3.1	3.6	5.0
Amapá	6.7	5.2	6.2	5.0	4.8
Rio Grande do Sul	1.9	2.2	3.0	3.3	4.5
Tocantins	3.2	2.9	2.2	2.8	3.7
Espírito Santo	3.1	1.9	2.0	3.0	3.3
Pará	1.8	2.2	2.4	2.3	3.1
Roraima	2.5	1.9	1.7	5.3	3.0
Paraíba	1.5	1.2	1.4	2.0	2.8
Mato Grosso do Sul	1.3	2.5	3.2	2.7	2.8
Distrito Federal	1.7	1.6	1.6	2.1	2.7
São Paulo	1.4	1.4	1.3	1.9	2.5
Bahia	1.1	1.0	1.3	1.5	2.1
Amazonas	2.1	2.4	2.0	1.3	1.7
Maranhão	1.2	1.6	1.1	1.0	1.5
Paraná	0.6	0.5	0.7	1.0	1.4
Acre	7.3	3.4	2.2	1.1	1.3
Minas Gerais	0.7	0.7	0.8	0.9	1.2
Goiás	0.8	0.9	0.9	0.9	1.2
Rondônia	0.3	0.4	0.3	0.4	1.1
Santa Catarina	0.5	0.4	0.6	0.9	1.1
Mato Grosso	1.5	1.3	0.9	1.3	1.1
Piauí	0.7	0.3	0.3	0.6	0.8

Tasa de incidencia (por 1000 nacidos vivos) de sífilis congénita en menores de 1 año por estado y año de diagnóstico. Brasil, 2011.



Fuente: MS/SVS/Departamento de ITS, Sida y Hepatitis Virales

Notas: (1) Casos notificados al SINAN hasta el 30/06/2011

(2) estados ordenados según la tasa de detección de 2011

- Pacto por la Salud, cuyo objetivo es reducir la mortalidad maternoinfantil, uno de cuyos componentes es reducir las tasas de transmisión vertical del VIH y de la sífilis
- Plan Operativo de Reducción de la Transmisión Vertical del VIH y la Sífilis Congénita
- Plan Integral de Lucha contra la Feminización del VIH/Sida y otras ITS

- «Red Cigüeña»
- Prevención de la infección por el VIH en mujeres en edad fértil
- Conocimiento precoz del estado serológico (prenatal)
- Tratamiento adecuado

Visite o *site* da SVS
www.saude.gov.br/svs

