




Consulta Técnica sobre Vigilância da Resistência do HIV na América Latina e Caribe

Vigilância da resistência inicial em pacientes menores de 18 meses de idade

Rodrigo Zilli Haanwinckel
Departamento de DST-Aids-HV
Ministério da Saúde - Brasil

Taxa de incidência de aids (por 100.000 habitantes) em menores de 5 anos segundo região de residência por ano de diagnóstico. Brasil, 1998 a 2010



FONTE: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais




Diagnóstico tardio de transmissão vertical

Idade do diagnóstico	2009	2010	2011
<1 ano	137	156	182
1 a <5 anos	281	271	239
5 a <13 anos	541	433	327
TOTAL	959	860	748
Diagnóstico tardio de TV ≥ 1 ano de idade	86%	82%	76%
Diagnóstico tardio de TV ≥ 5 anos de idade	56%	50%	44%


FONTE: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais

Total de crianças (0 a 12 anos) expostas ou vivendo com HIV/aids em acompanhamento no período de JAN/2011 a AGO/2012 por UF (n= 21.162)




FONTE: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais

Número de crianças e adolescentes que iniciaram TARV




Fonte: SICLOM/SVS

Total de crianças (0 a 12 anos) em TARV de 2011 a ago/2012, por UF (n= 4.547)



FONTE: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais

Número de crianças e adolescentes em TARV



FONTE: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais

Diretrizes de Aids em Pediatria




2009

Recomendações para Terapia Antirretroviral em Crianças e Adolescentes Infectados pelo HIV


MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Vigilância em Saúde
Programa Nacional de DST e Aids
GUIA DE TRATAMENTO

Recomendações para Terapia Antirretroviral em Crianças e Adolescentes Infectados pelo HIV



Brasília - DF

Ministério da Saúde




Recomendações para Terapia Antirretroviral
em Crianças e Adolescentes Infectados pelo HIV
2009

Suplemento II

Objetivos da terapia antirretroviral
Recomendações de manejo da falha terapêutica
Critérios de indicação de Inibidores da Protease
para crianças e adolescentes


Brasília - DF
2011

Status da infecção pelo HIV em menores de 12 meses de idade (%), Brasil, 2011. n=6.993




FONTE: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais

Número de menores de 12 meses de idade infectados ou provavelmente infectados pelo HIV , por UF, 2011




FONTE: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais

Genotipagens pré-TARV em crianças e adolescentes (0 a 17 anos)




FONTE: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais

Genotipagens pré-TARV que possuem mutações no SISGENO, em crianças e adolescentes (0 a 17 anos), JAN/2010 a AGO/2012. n=738




FONTE: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais

Genotipagem pré-TARV em crianças < 1 ano (n=141). Perfil de sensibilidade a ITRN(%), JAN/2010 a AGO/2012




FONTE: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais

Genotipagem pré-TARV em crianças < 1 ano (n=141). Perfil de sensibilidade a ITRNN(%), JAN/2010 a AGO/2012



FONTE: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais

Genotipagem pré-TARV em crianças < 1 ano (n=141). Perfil de sensibilidade a IP/r(%), JAN/2010 a AGO/2012



FONTE: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais



Obrigado

Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais

www.aids.gov.br
rodrigo.zilli@aims.gov.br