

Regional Update EW 14, 2015

Influenza and other respiratory virus (April 22, 2015)

Actualización Regional SE 14, 2015

Influenza y otros virus respiratorios (22 de abril, 2015)

PAHO interactive influenza data

Datos interactivos de influenza de la OPS:

http://ais.paho.org/php/viz/ed_flu.asp

Influenza Regional Reports:

Informes regionales de influenza:

www.paho.org/influenzareports

www.paho.org/reportesinfluenza


Severe acute respiratory infections network - SARInet

Red de las infecciones respiratorias agudas graves - SARInet:

<http://www.sarinet.org/>

The information presented in this update is based on data provided by Ministries of Health and National Influenza Centers of Member States to the informatics global platforms [FluNet](#) and [Fluid](#); and reports/weekly bulletins that Ministries of Health published on its website or shared with PAHO/WHO.

La información presentada en esta actualización se obtiene a partir de los datos reportados por los Ministerios de Salud y los Centros Nacionales de Influenza de los Estados Miembros a las plataformas informáticas globales de [FluNet](#) y [Fluid](#); y de los reportes/boletines semanales que los Ministerios de Salud publican en sus páginas web o comparten con OPS/OMS.



Map production /Producción del mapa: PAHO/WHO. OPS/OMS.

Data Source / Fuente de datos: Ministries of Health and National Influenza Centers of Member States reports to the informatics global platforms [FluNet](#) and [Fluid](#) / Reporte de los Ministerios de Salud y los Centros Nacionales de Influenza de los Estados Miembros a las plataformas informáticas globales de [FluNet](#) y [Fluid](#)


WEEKLY SUMMARY (ENGLISH)

- **North America:** Most influenza activity indicators continued to decrease. In Canada, ILI activity increased this week and is above expected levels. No region reported widespread influenza/ILI activity. Influenza detections continued to decrease and influenza B (12.2% positivity) predominated in recent weeks. Influenza A(H3N2) and influenza B (Yamagata lineage) have predominated this season. Influenza hospitalizations decreased among adults but increased among children. In the United States, ILI activity (1.8%) continued to decrease and this week was below the national baseline. This week the majority of states reported minimal ILI activity. Influenza detections (9.6% positivity) continued to decrease, with influenza B (Yamagata lineage) predominating. Pneumonia and influenza mortality (6.1%) continued below the epidemic threshold of 7.1%. In Mexico, ARI activity continued to decrease while pneumonia activity remained at high levels. Influenza A(H3N2) predominated among circulating influenza viruses with 16.7% influenza positivity reported during EW 13.
- **Caribbean:** French Guyana reported high influenza activity, associated with influenza B. In other countries of the sub-region, respiratory virus activity information was not reported.
- **Central America:** Respiratory virus activity remained low and ARI/SARI activity continued within expected levels. RSV continued to predominate in the sub-region with circulation at low levels. An increase of influenza A(H3N2) detections was reported in Guatemala in recent weeks.
- **Andean Sub-region:** High RSV activity in Ecuador and Colombia. Regarding influenza, in Colombia, the co-circulation of influenza A(H1N1)pdm09, A(H3N2) and B continued to decrease. Slight increase of influenza A(H3N2) reported in Peru.
- **Southern Cone:** Influenza activity remained at inter-seasonal levels and ARI/SARI and other respiratory virus activity remained low. In Paraguay, ILI activity continued to increase associated with RSV activity.

RESUMEN SEMANAL (ESPAÑOL)


- **América del Norte:** La mayoría de indicadores de actividad de influenza continúan decreciendo. En Canadá, la actividad de ETI incrementó esta semana y está por encima de los niveles esperados. Ninguna región reportó actividad diseminada de ETI/influenza. Las detecciones de influenza continúan disminuyendo, con predominio de influenza B (12,2% de positividad) en las últimas semanas. Influenza A(H3N2) e influenza B (linaje Yamagata) han predominado esta temporada. Las hospitalizaciones por influenza disminuyeron entre adultos pero aumentaron entre niños. En los Estados Unidos, la actividad de ETI (1,8%) continúa disminuyendo, y esta semana se encuentra por debajo de la línea de base. Esta semana, la mayoría de estados reportaron actividad mínima de influenza. Las detecciones de influenza (9,6% de positividad) continúan disminuyendo y predomina circulación de influenza B (linaje Yamagata). El porcentaje de mortalidad por neumonía e influenza (6,1%) continúa por debajo del umbral epidémico del 7,1%. En México, la actividad de IRA y la de neumonía continúan disminuyendo. Influenza A(H3N2) ha predominado entre los virus circulantes de influenza, con un 16,7% de positividad en la SE 13.
- **Caribe:** La actividad de influenza se reporta alta en Guyana Francesa, principalmente asociada a influenza B. En los otros países de la sub-región, la actividad de virus respiratorios continúa baja o no se reportó información.
- **América Central:** La actividad de virus respiratorios continúa baja y la actividad de IRA/IRAG permanece dentro de niveles esperados. VSR continúa predominado en la sub-región, con niveles bajos de circulación y en las últimas semanas se ha reportado un aumento en las detecciones de influenza A(H3N2) en Guatemala.
- **Sub-región Andina:** Actividad elevada de VSR en Ecuador y Colombia. Con respecto a influenza, la co-circulación observada en Colombia de influenza A(H1N1)pdm09, A(H3N2) y B continúa disminuyendo. Se reporta un ligero incremento en las detecciones de influenza A(H3N2) en Perú.
- **Cono Sur:** La actividad de influenza se mantiene en niveles inter-estacionales y la actividad de IRA/IRAG y de otros virus respiratorios permanece baja. En Paraguay la actividad de ETI continúa alta, asociada a la actividad de VSR.

Influenza circulation by region. 2012-15



Circulación virus influenza por región. 2012-15

Respiratory syncytial virus (RSV) circulation by region. 2010-15



Weekly and cumulative numbers of influenza and other respiratory virus, by country and EW, 2015¹
Número semanal y acumulado de influenza y otros virus respiratorios, por país y SE, 2015²

EW 14, 2015 / SE 14, 2015

		N samples/muestras	Influenza A(H3N2)	Influenza A(H1N1)pdm09	Influenza A Not Subtyped/No subtipificado	Influenza B	% influenza(+)	Adenovirus	Parainfluenza	RSV/VSR	% RSV/VSR (+)	Bocavirus	Coronavirus	Metapneumovirus	Rinovirus
North America/ América del Norte		Mexico	225	9	0	0	10	8%	0	0	0	0%			
		United States of America	11,189	46	3	90	937								
Caribbean/ Caribe		Cuba	55	4	1	0	8	24%	5	0	0	0%	34	1	2
		Dominican Republic	7				0								
		Jamaica	1	0	0	0	0	0%							
Central America/ América Central		Costa Rica	57	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%			
		El Salvador	35	0	1	0	0	3%	0	3	2	6%			
		Guatemala	3	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0
Andean Region/ Región Andina		Colombia	62	0	0	4	0	6%	2	5	19	31%	3	1	1
		Ecuador	51	1	0	0	0	2%	0	2	10	20%		2	36
		Peru	56	6	1	0	0	13%	0	1	3	5%	0	0	0
Brazil & Southern Cone/ Cono Sur		Argentina	233	0	0	2	1	1%	2	1	17	7%			0
		Brazil	42	0	1	0	0	2%							
		Chile	439				1		12	18	7	2%			
		Paraguay	92	0	0	0	1	1%	1	0	61	66%	0	0	0
Grand Total			12,547	66	7	96	958	9%	22	30	119	1%	37	2	5
Cumulative, EW 11-14, 2015 / Acumulado, SE 11-14, 2015															

		N samples/muestras	Influenza A(H3N2)	Influenza A(H1N1)pdm09	Influenza A Not Subtyped/No subtipificado	Influenza B	% influenza(+)	Adenovirus	Parainfluenza	RSV/VSR	% RSV/VSR (+)	Bocavirus	Coronavirus	Metapneumovirus	Rinovirus
North America/ América del Norte		Canada	5,752	72	3	237	661	17%							
		Mexico	1,049	68	2	0	47	11%	0	0	3	0%			
		United States of America	53,353	493	11	650	4,632	11%							
Caribbean/ Caribe		Barbados	1			0									
		Cuba	292	7	4	0	23	12%	24	0	0	0%	125	2	13
		Dominican Republic	46				0								2
		Jamaica	20	0	0	0	0	0%							
Central America/ América Central		Costa Rica	198	1	0	0	0	1%	3	2	1	1%			
		El Salvador	120	2	1	1	0	3%	1	5	14	12%			
		Guatemala	66	2	0	5	0	11%	0	1	6	9%	0	0	2
		Nicaragua	60			0			2						0
		Panama	42			0			2	9	2	5%		1	16
Andean Region/ Región Andina		Bolivia - INLASA	60			0				4		7%			
		Colombia	425	5	11	4	0	5%	17	28	160	38%	14	9	7
		Ecuador	441	4	0	0	1	1%	0	6	71	16%		21	238
		Peru	201	37	3	0	0	20%	2	2	18	9%	0	0	1
Brazil & Southern Cone/ Cono Sur		Argentina	1,313	0	0	3	2	0%	12	11	49	4%			0
		Brazil	413	32	3	0	7	10%							1
		Chile	1,695	2	1		5		34	35	12	1%			
		Paraguay	465	0	0	0	4	1%	9	0	286	62%	0	0	0
		Uruguay	0			0									0
Grand Total			66,012	725	39	900	5,382	11%	104	101	626	1%	139	11	46

¹ The detection of respiratory viruses other than influenza depends on the diagnostic capacity of each country and monitoring system. The absence of report of other respiratory viruses does not indicate the absence of their circulation.

² La detección de otros virus respiratorios diferentes a influenza depende de la capacidad diagnóstica de cada país y del sistema de vigilancia establecido. El que no se reporten otros virus respiratorios, no significa, ni indica la ausencia de circulación viral.


**EPIDEMIOLOGIC AND VIROLOGIC UPDATE
OF INFLUENZA & OTHER RESPIRATORY
VIRUS BY COUNTRY**
North America / América del Norte:

**ACTUALIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y
VIROLÓGICA DE INFLUENZA Y OTROS VIRUS
RESPIRATORIOS DESAGREGADA POR PAÍS**


Canada

- ILI activity increased above expected levels in EW 14 / La actividad de ETI incrementó más allá de los niveles esperados en la SE 14
- In EW 14 no regions reported widespread influenza/ILI activity / En la SE 14, ninguna región reportó actividad diseminada de influenza/ETI
- Detections of influenza A (2.2% positivity this week), mainly A(H3N2), and of influenza B (12.2% positivity this week) continue to decrease in EW 14 / Las detecciones de influenza A (2,2% de positividad esta semana), principalmente A (H3N2), y las de influenza B (12,2% de positividad esta semana) continúan disminuyendo en la SE 14
- 173 of 179 influenza A(H3N2) viruses characterized (97%) were antigenically similar to A/Switzerland/9715293/2013, the influenza A(H3N2) virus selected for the 2015 Southern Hemisphere and 2015/16 Northern Hemisphere vaccine / 173 de 179 virus influenza A(H3N2) caracterizados (97%) fueron antigenicamente similares a A/Switzerland/9715293/2013, el virus influenza A(H3N2) seleccionado para la vacuna del hemisferio sur 2015 y del hemisferio norte 2015/16
- RSV activity remained the same as the previous week / La actividad de VSR continuó igual a la semana previa.
- Influenza hospitalizations decreased among adults but increased among children <16 years. Nonetheless, the majority of hospitalizations and deaths have been recorded among adults aged ≥65 years / Las hospitalizaciones por influenza disminuyeron entre adultos pero aumentaron entre niños <16 años. Sin embargo, la mayoría de hospitalizaciones y defunciones han sido registradas en adultos ≥65 años
- Laboratory-confirmed influenza outbreaks remained the same as the previous week / Los brotes de influenza confirmados por laboratorio continúan igual a la semana previa


Canada: ILI consultation rates by EW, 2014-15
Tasa de consultas de ETI, por SE, 2014-15



Canada: Respiratory virus distribution by EW, 2014-15
Distribución de virus respiratorios por SE, 2014 -15



Canada: Influenza virus distribution by EW, 2014-15
Distribución de virus de influenza por SE, 2014 -15







Canada: Influenza/ILI activity by province/territory, EW 14, 2015
Actividad de Influenza/ETI por provincia/territorio, SE 14, 2015




United States

- ILI activity (1.8%) continued to decrease and is below the national baseline / La actividad de ETI (1,8%) continúa disminuyendo y se encuentra por debajo de la línea de base nacional
- Widespread influenza activity reported in three states / Actividad diseminada de influenza reportada en tres estados
- Influenza detections (9.6% of positivity this week) continue to decrease / Las detecciones de influenza (9,6% de positividad esta semana) continúan disminuyendo
- During EW 14, influenza B predominated with low circulation of influenza A (not subtyped) and influenza A(H3) / En la SE 14, predominó influenza B, con menor circulación de influenza A (no subtipificada) e influenza A(H3)
- 859 of 1.102 influenza A(H3N2) viruses characterized (78%) were antigenically similar to A/Switzerland/9715293/2013, the influenza A(H3N2) virus selected for the 2015 Southern Hemisphere and 2015/16 Northern Hemisphere vaccine/ 859 de 1,102 virus influenza A(H3N2) caracterizados (78%) fueron antigenéticamente similares a A/Switzerland/9715293/2013, el virus influenza A(H3N2) seleccionado para la vacuna del hemisferio sur 2015 y del hemisferio norte 2015/2016
- The overall influenza-associated hospitalization rate was 62.4 per 100,000 population with the highest rate among adults aged ≥ 65 years (308.0 per 100,000) / La tasa de hospitalizaciones asociadas a influenza fue de 62,4 por 100.000 habitantes, siendo la tasa más alta la registrada entre los adultos ≥ 65 años (308,0 por 100.000)
- Pneumonia and influenza mortality (6.1%) continued well below the epidemic threshold of 7.1% / La mortalidad por neumonía e influenza (6,1%) continúa por muy debajo del umbral epidémico del 7,1%
- RSV activity continued to decrease with 10.4% of positives among samples tested last week / La actividad de VSR continúa disminuyendo, con un 10,4% de positivos entre las muestras analizadas la semana pasada
-



US: Percent positivity for respiratory virus under surveillance, by EW, 2012-15
 Porcentaje de positividad para virus respiratorios en vigilancia, por SE, 2012-15




Mexico


- ARI activity (397 ARI cases per 100.000 hab. during EW 13) is at low level and continued to decrease / Actividad de IRA (397 casos de IRA por 100,000 hab. en la SE 13) en niveles bajos y continúa descendiendo
- The pneumonia activity continued at a high level (3.1 pneumonia cases per 100.000 hab. during EW 13) and above the expected levels. The states with the highest pneumonia activity during EW 12 were Chihuahua, and Nuevo León / La actividad de neumonía (3,1 casos de neumonía por 100,000 hab. en la SE 13) continúa alta y por encima de niveles esperados. Los estados con la mayor actividad de neumonía durante la SE 12 fueron Chihuahua y Nuevo León
- Influenza detections (16.7% of positivity in EW 13) decreased in the last nine EW with influenza A(H3N2) predominating / Las detecciones de influenza (16,7% de positividad en la SE 13) disminuyeron en las últimas nueve SE, con predominio de influenza A(H3N2)

Mexico: ARI Endemic Channel, 2014-15
 Canal Endémico de IRA, 2014-15

Gráfica 5. Canal endémico de IRA. México, 2014-2015




Mexico: Influenza virus distribution by EW 2013-15
 Distribución de virus influenza por SE, 2013-15




Mexico: Pneumonia Endemic Channel, 2014-15
 Canal endémico de neumonía, 2014-15

Méjico / Nacional
 Tasa de neumonías x 100,000 hab en 2014/2015
 comparados con estaciones 2007/2008 a 2013/2014 (excluido 2009)



Mexico: Pneumonia rate by state, EW 12, 2015
 Tasa de neumonía por entidad federativa, SE 12, 2015




Caribbean / Caribe:

Barbados

- Few respiratory virus detections with parainfluenza predominated among circulating viruses / Pocas detecciones de virus respiratorios, con predominio de parainfluenza


Barbados: Respiratory virus distribution by EW, 2014-15
Distribución de virus respiratorios por SE, 2014-15




Cuba

- The number of SARI cases increased in EW 13. Most of the SARI cases are in the <5 years old group / El número de casos IRAG increment en la SE 13. La mayoría de casos se registra en el grupo de <5 años
- Rhinovirus and parainfluenza predominated among circulating viruses / Entre los virus respiratorios, predomina la circulación de rinovirus y parainfluenza
- Slight increased detections of influenza in the last weeks / Aumento leve en las detecciones de influenza en las últimas semanas

Cuba: SARI cases by age group, by EW, 2015
Casos IRAG por grupos de edad por SE, 2015




Cuba. Respiratory virus distribution by EW, 2013-15
Distribución de virus respiratorios por SE, 2013-15



Dominican Republic / República Dominicana

- Few respiratory virus detections during 2015 with parainfluenza predominating/ Pocas detecciones de virus respiratorios durante 2014, con predominio de parainfluenza
- RSV predominated among circulating virus during 2014 but few detections have been recorded during 2015 / Entre los virus respiratorios, predominó la circulación de VSR durante 2014 pero durante el 2015 se han registrado pocas detecciones


Dominican Republic: Respiratory virus distribution by EW, 2013-15
Distribución de virus respiratorios por SE, 2013-15




Jamaica

- During EW 14, the proportion of consultations for ARI reported from sentinel sites decreased to 3.5%. Rates of ARI were highest in Hanover, Saint James and Saint Ann parishes; rates of pneumonia were highest in Hanover and Portland / En la SE 14, la proporción de consultas de IRA reportada por los sitios sentinelas disminuyó a 3,5%. Las tasas de IRA fueron más altas en los distritos de Hanover, Saint James y Saint Ann y las tasas de neumonía fueron más altas en los distritos de Hanover y Portland
- The proportion of SARI hospitalizations decreased to 1.87%, higher than the previous week, and there were no SARI-related deaths reported for EW14 / La proporción de hospitalizaciones por IRAG disminuyó a 1,87%, mayor que la semana previa, y no se reportó ningún fallecido relacionado con IRAG en la SE14
- No cases of influenza were detected during EW 14 of 2015/ No se detectó ningún caso de influenza durante la SE 14 del 2015


Jamaica: ARI activity by parish, EW 14, 2015
Actividad de IRA, SE 14, 2015



Jamaica: Pneumonia activity by parish, EW 14, 2015
Actividad de Neumonía, SE 14, 2015



Jamaica: Influenza virus distribution, by EW, 2013-15
Distribución de virus influenza. por SE, 2013-15




Puerto Rico

- Low ILI activity / Actividad de ETI baja³
- Low levels of influenza detections in recent weeks / Niveles bajos de detecciones de influenza en las últimas semanas

Puerto Rico: Influenza-positive cases by EW, 2013-15
Casos positivos a influenza por SE, 2013-15


Gráfica 1. Número de Casos Positivos a Influenza por Prueba Rápida, Semana 14, Puerto Rico, 2015



³ As reported to CDC/De acuerdo al CDC: <http://www.cdc.gov/flu/weekly/>

French territories in the Americas / Territorios franceses en las Américas

- As of EW 14-15, high ILI activity and above expected levels in French Guyane / A las SE 14-15, actividad de ETI elevada y encima de los niveles esperados en Guyana Francesa
 - Influenza B predominated among influenza circulating virus / Influenza B ha predominado entre los virus circulantes de influenza




Central America / América Central:

Costa Rica


- SARI activity within expected levels / Actividad de IRAG dentro de niveles esperados
- Few respiratory virus detections were recorded in the last weeks with adenovirus predominated among circulating virus/ Se han registrado pocas detecciones en la últimas semanas y adenovirus ha predominado entre los virus circulantes

Costa Rica: Proportion of SARI-Associated Hospitalizations, ICU Admissions and Deaths, by EW, 2014-15



Fuente: Hospitales y Áreas de Salud Centinela - Hospitales Nacionales, CESS.


Costa Rica: Respiratory virus distribution, by EW, 2013-15
Distribución de virus respiratorios. por SE, 2013-15




El Salvador

- Low SARI activity and below expected levels / Actividad de IRAG baja y por debajo de niveles esperados
- Increasing trend of detections in recent weeks with circulation of RSV and parainfluenza / Tendencia creciente de detecciones en las últimas semanas, con circulación VSR y parainfluenza

El Salvador: SARI Endemic Channel, 2015
Canal Endémico de IRAG, 2015




El Salvador: Respiratory virus distribution, by EW, 2013-15
Distribución de virus respiratorios. por SE, 2013-15




Guatemala

- Some influenza detections in recent weeks, mainly influenza A(H3N2) / Algunas detecciones de influenza en las últimas semanas, principalmente influenza A(H3N2)
- Few respiratory detections in recent weeks with RSV and influenza A(H3N2) predominated/ Pocas detecciones respiratorias en las últimas semanas, con predominio de VSR e influenza A(H3N2)

Guatemala: Influenza virus distribution, by EW, 2013-15
Distribución de virus influenza, por SE, 2013-15




Guatemala: Respiratory virus distribution, by EW, 2013-15
Distribución de virus respiratorios por SE, 2013-15




Honduras

- SARI activity decreased in recent weeks / La actividad de IRAG se disminuyó en las últimas semanas
 - Low and decreasing RSV detections during 2015 / Durante 2015, pocas detecciones de VSR y decrecientes
 - No influenza viruses detected since EW 2 of 2015 / No se han detectado virus influenza desde la SE 2 de 2015

Honduras: % SARI Hospitalizations, ICU Admissions & Deaths by EW 2015




Honduras: Respiratory virus distribution by EW, 2013-15 Distribución de virus respiratorios por SE, 2013-15




Nicaragua

- ARI and pneumonia activity continued within expected levels/ La actividad de IRA y neumonía continúa dentro de niveles esperados
 - Low respiratory virus activity with RSV and parainfluenza predominated/ Actividad baja de virus respiratorios, con predominio de VSR y parainfluenza
 - No influenza viruses detected since EW 49 of 2014 / No se han detectado virus influenza desde la SE 49 de 2014


Nicaragua: Pneumonia rate by EW, 2015



Nicaragua: ARI rate by EW, 2015





Nicaragua: Respiratory virus distribution by EW, 2013-15 Distribución de virus respiratorios por SE. 2013-15



Panama


- Low respiratory virus activity in recent weeks / Baja actividad viral respiratoria en las últimas semanas
- No influenza detections since EW 1 of 2015 / Sin detecciones de influenza desde la SE 1 de 2015
- Among other respiratory viruses, low circulation of parainfluenza and rhinovirus were detected / Respecto a otros virus respiratorios, se observa circulación baja de parainfluenza y rinovirus



South America / América del sur – Andean countries / Países andinos:

Bolivia


- In La Paz, low respiratory virus activity with very few detections, mainly RSV / En La Paz, actividad baja de virus respiratorios, con muy pocas detecciones principalmente de VSR
 - In La Paz, no influenza detections since EW 4 of 2015 / En La Paz, sin detecciones de influenza desde la SE 4 de 2015
 -




Colombia

- ARI activity in outpatient consultations and hospitalizations within expected levels in comparison with previous years / Actividad de IRA en consultas externas y en hospitalización dentro de los niveles esperados en comparación con los años anteriores.
 - Decreasing trend of influenza detections after the peak recorded in EW 4 in recent weeks and with 3.8% of positivity in EW 12 / Tendencia decreciente en las detecciones de influenza desde su pico en la SE 4. El porcentaje de positividad a influenza fue del 3,8% en la SE 12
 - Increased respiratory virus detections in last weeks with RSV predominating / Incremento de la actividad de virus respiratorios en las últimas semanas, con predominio de VSR


Colombia: Rate of ARI outpatient visits with J00-J20 codes, by EW, 2015




Colombia: Respiratory virus distribution by EW, 2013-15 Distribución de virus respiratorios por SE, 2013-15



Colombia: Rate of pneumonia in hospitalizations with J00 to J20 codes, by EW 2015




Colombia. Influenza virus distribution by EW, 2013-15 Distribución de virus influenza por SE. 2013-15




Ecuador

- SARI cases in the ICU increased sharply in EW 13 / Casos de IRAG en la UCI se incrementaron bruscamente en la SE 13
- High RSV activity during 2015 with 21% of positivity and with low influenza circulation. An increase of metapneumovirus detections was reported in recent weeks/ Actividad elevada de VSR durante 2015, con 21% de muestras positivas y con poca circulación de influenza. Se reportó ligero aumento en las detecciones de metapneumovirus humano en las últimas semanas
- Pneumonia activity fell dramatically in week 15, reaching levels comparable with 2012 and 2013 for the first time this year. In EW 15 the provinces with the highest rates of pneumonia were Morona Santiago and Pastaza / La actividad de neumonías bajó dramaticamente en la semana 15, llegando a niveles comparables con los años 2012 y 2013 por la primera vez este año. Las provincias que reportaron mayores tasas de neumonías en la SE 15 fueron Morona Santiago y Pastaza


Ecuador: % SARI Hospitalizations, ICU Admissions & Deaths by EW 2012-15




Ecuador: Pneumonia rates by province and by 100,000 hab.
EW 15, 2015



Ecuador SARI: Respiratory virus distribution by EW, 2013-15
IRAG: Distribución de virus respiratorios, 2013-15




Ecuador: Pneumonia rates by 100,000 hab and EW, 2013-2015




Peru

- ARI activity in children under five years within expected levels / Actividad de IRA en menores de cinco años en niveles esperados
- Few respiratory virus detections during 2015 with minimal increase of influenza A(H3N2) detections in recent weeks/ Pocas detecciones de virus respiratorios durante el 2015, con mínimo aumento en las detecciones de influenza A(H3N2) en las últimas semanas

Peru: ARI endemic channel in children under five years by EW, 2015




Peru. Respiratory virus distribution by EW, 2013-15
Distribución de virus respiratorios por SE 2013-15





Argentina


- Low ILI activity within expected levels / Actividad baja de ETI, dentro de niveles esperados
- Increasing SARI activity, slightly higher than expected this time of year / Actividad de IRAG en aumento, niveles ligeramente más altos que lo esperado en esta época del año
- Very few respiratory virus detections in the last weeks / Muy pocas detecciones de virus respiratorios en las últimas semanas



Argentina. Respiratory virus distribution by EW, 2013-15
Distribución de virus respiratorios por SE, 2013-15



Argentina. Influenza virus distribution by EW, 2013-15
Distribución de virus influenza por SE, 2013-15



Brazil


- Low ILI/SARI activity and within expected levels / Actividad baja de ETI/IRAG, dentro de niveles esperados y con tendencia decreciente
- Downward trend of respiratory virus activity / Tendencia decreciente de actividad viral respiratoria

Brazil: Respiratory virus distribution in ILI cases, by EW, 2015
Distribución de virus respiratorios en casos ETI, por SE, 2015
Figura 1. Distribuição dos vírus respiratórios identificados nas unidades sentinelas de Síndrome Gripal, por semana epidemiológica de início dos sintomas. Brasil, 2015 até a SE 14.




Brazil: Respiratory virus distribution, SARI cases, by EW, 2014-15
Distribución de virus respiratorios, casos IRAG, por SE, 2014-15

Figura 3. Distribuição dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave segundo agente etiológico e semana epidemiológica de início dos sintomas. Brasil, 2015 até a SE 14.





Brazil: Distribution of SARI hospitalizations and deaths by municipality and influenza type/subtype by region
 Distribución de hospitalizaciones y fallecidos por IRAG por municipio y tipo/subtipo de influenza por región
 Anexo 3. Distribuição espacial dos casos e óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave confirmados para influenza por município de residência. Brasil, 2015 até a SE 14.




Fonte: SINAN Influenza Web. Dados atualizados em 14/04/2015, sujeitos a alteração.
 * O círculo é proporcional ao número de casos e óbitos.

Chile


- Low ILI/SARI activity and within expected levels / Actividad baja de ETI/IRAG y dentro de niveles esperados
- Low levels of respiratory virus activity with few detections in the last weeks/ Niveles bajos de actividad viral respiratoria con pocas detecciones en las últimas semanas



Chile. Respiratory virus distribution by EW, 2013-15
 Distribución de virus respiratorios, por SE, 2013-15




Chile: Influenza virus distribution by EW, 2013-15
 Distribución de virus de influenza, por SE, 2013-15




Paraguay

- Low ILI activity but with increasing trend and above expected levels / Actividad baja de ETI, pero con tendencia creciente y superior a los niveles esperados
- Low SARI activity but with an increasing trend in recent weeks/ Actividad baja de IRAG, pero con tendencia creciente en las últimas semanas
- Low influenza activity / Actividad baja de influenza
- Declining RSV detections in EW 14/ Detecciones decrecientes de VSR en la SE 14
- In EW 10 the departments with the highest rates of ARI and pneumonia were Alto Paraguay, Boqueron and San Pedro / Los departamentos que reportaron mayores tasas de IRA y neumonía en la SE 10 fueron Alto Paraguay, Boqueron y San Pedro


Paraguay. ILI endemic channel, by EW, 2015
Canal endémico de ETI por SE, 2015




Paraguay:% SARI Hospitalizations, ICU Admissions & Deaths by EW 2014-15




Paraguay: ARI rates by department and by 100,000 hab.
EW 10, 2015




Paraguay. Respiratory virus distribution by EW, 2013-15
Distribución de virus respiratorios por SE, 2013-15



Paraguay: Influenza virus distribution by EW, 2013-15
Distribución de virus de influenza, por SE, 2013-15




Paraguay: Pneumonia rates by department and by 100,000 hab.
EW 10, 2015




Uruguay

- Minimal SARI hospitalizations and within expected levels / Hospitalizaciones mínimas de IRAG y dentro de niveles esperados
- Very few respiratory virus detections in recent weeks / Muy pocas detecciones de virus respiratorios en las últimas semanas
- No influenza viruses detected / No se han detectado virus influenza

Uruguay: % SARI-associated hospitalizations & ICU admissions by EW, 2015




Uruguay: Respiratory virus distribution by EW, 2013-15



- In Europe, influenza activity continued to decline in most countries with influenza A(H3N2) predominated. In northern Africa and the Middle East, influenza activity decreased with influenza A(H1N1)pdm09 predominated. In western Asia and the temperate countries of Asia, influenza activity decreased in most countries. In tropical Asia, influenza activity remained high and influenza A(H1N1)pdm09 predominated / En Europa, la actividad de influenza continúa descendiendo en la mayoría de países con predominio de influenza A(H3N2). En el norte de África y el Oriente Medio, la actividad de influenza descendió con predominio de influenza A(H1N1)pdm09. En el oeste de Asia y en los países templados de Asia, la actividad de influenza descendió en la mayoría de países. En Asia tropical, la actividad de influenza continúa elevada con predominio de influenza A(H1N1)pdm09.
- During EW 10 and 11 of 2015, the WHO GISRS laboratories tested more than 87,715 specimens. 17,828 were positive for influenza viruses, of which 9,119 (51.1%) were typed as influenza A and 8,707 (48.9%) as influenza B. Of the sub-typed influenza A viruses, 2,558 (49.8%) were influenza A(H1N1)pdm09 and 2,579 (50.2%) were influenza A(H3N2). Of the characterized B viruses, 427 (97.7%) belonged to the B-Yamagata lineage and 10 (2.3%) to the B-Victoria lineage / Durante las SE 10 y 11 de 2015, los laboratorios del sistema de vigilancia global de influenza y respuesta (GISRS) de la OMS analizaron más de 87.715 muestras: 17.828 fueron positivas a influenza, de las cuales 9.119 (51,1%) se tipificaron como influenza A y 8.707 (48,9%) como influenza B. De los virus sub-tipificados de influenza A, 2.558 (49,8%) fueron influenza A(H1N1)pdm09 y 2.579 (50,2%) influenza A(H3N2). De los virus influenza B caracterizados, 427 (97,7%) pertenecían al linaje B-Yamagata y 10 (2,3%) al linaje B-Victoria

Nivel global: Porcentaje de muestras respiratorias positivas a influenza por zona de transmisión de influenza, hasta el 22 de marzo, 2015



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Data Source: Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS), FluNet (www.who.int/flu).

 **World Health Organization**
© WHO 2015. All rights reserved.

ACRONYMS

ARI	Acute respiratory infection
CARPHA	Caribbean Public Health Agency
CENETROP	Centro de Enfermedades Tropicales (Santa Cruz, Bolivia)
EW	Epidemiological Week
ILI	Influenza-like illness
INLASA	Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (La Paz, Bolivia)
INS	Instituto Nacional de Salud
ORV	Other respiratory viruses
SARI	Severe acute respiratory infection
SEDES	Servicio Departamental de Salud (Bolivia)
ICU	Intensive Care Unit
RSV	Respiratory Syncytial Virus

ACRÓNIMOS

CARPHA	Caribbean Public Health Agency
CENETROP	Centro de Enfermedades Tropicales (Santa Cruz, Bolivia)
ETI	Enfermedad tipo influenza
INLASA	Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (La Paz, Bolivia)
INS	Instituto Nacional de Salud
IRA	Infección respiratoria aguda
IRAG	Infección respiratoria aguda grave
OVR	Otros virus respiratorios
SE	Semana epidemiológica
SEDES	Servicio Departamental de Salud (Bolivia)
UCI	Unidad de Cuidados Intensivos
VSR	Virus sincitial respiratorio