



## Prevención del Tétanos en el Manejo de Heridas: Instrucción para Haití

Las personas, adultos o niños, con heridas grandes o sucias, deben de recibir inmunoglobulina tetánica y también una dosis de toxoide tetánico, a menos que pueda documentarse que han recibido 3 dosis o más de toxoide tetánico y la última dosis ha sido aplicada en los últimos 10 años.

### QUÉ APLICAR:

- Inmunoglobulina tetánica
- Toxoide tetánico

### CUÁNTO APLICAR:

#### Inmunoglobulina tetánica:

- 250 unidades si es de origen humano
- 1500 a 5000 unidades si es de origen animal (equino)

#### Toxoide tetánico:

- Aplicar 0,5 ml intramuscular

El toxoide tetánico puede ser en las siguientes presentaciones:

**DTP:** vacuna para uso infantil que se aplica antes de los 7 años de edad y que contiene toxoide diftérico y tetánico más vacuna contra la tos ferina o coqueluche.

**DTaP:** exactamente como la anterior excepto que el componente de pertussis o tos ferina es acelular.

**DT:** toxoide diftérico y tetánico para uso en niños menores de 7 años.

**Td:** toxoide diftérico y tetánico para uso en adultos (a partir de los 7 años).

### CUÁNDO PONER TOXOIDE TETÁNICO O INMUNOGLOBULINA:

Dosis previas que ha recibido de toxoide tetánico	Heridas limpias y pequeñas		Heridas sucias y grandes	
	Toxoide tetánico	Inmunoglobulina tetánica	Toxoide tetánico	Inmunoglobulina tetánica
Incierto o menos de 3	Sí	No	Sí	Sí
3 dosis o más	No	No	No	No



### **CÓMO ALMACENAR Y TRANSPORTAR:**

Tanto las vacunas como la inmunoglobulina deben de ser transportadas, almacenadas y mantenidas en condiciones de refrigeración (2 a 8 grados centígrados) hasta el momento de su uso. NO CONGELAR.

### **NOTA:**

ESTAS INSTRUCCIONES SON PARA LA APLICACIÓN DE TOXOIDE TETÁNICO  
EN SITIOS DONDE SE ATIENDEN HERIDOS O SE HACE CIRUGÍA;

NO SON PARA CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN NI PARA VACUNACIÓN  
REGULAR.