

Prévention du tétanos lors de la prise en charge des blessures: instructions pour Haïti

Les adultes ou enfants ayant des blessures profondes ou souillées doivent recevoir des immunoglobulines anti-tétaniques ainsi qu'une dose d'anatoxine tétanique, à moins qu'ils ne puissent prouver par un document qu'ils ont reçu au moins 3 doses d'anatoxine tétanique et que la dernière dose a été administrée au cours des 10 dernières années.

CE QU'IL FAUT ADMINISTRER

- Immunoglobulines anti-tétaniques (sérum anti-tétanique)
- Anatoxine tétanique (vaccin anti-tétanique)

QUANTITÉ À ADMINISTRER

Immunoglobulines anti-tétaniques:

- 250 unités si elles sont d'origine humaine
- 1500 à 5000 unités si elles sont d'origine animale (chevaline)
- On préfère les immunoglobulines d'origine *humaine*. Si une personne qui a déjà reçu dans le passé des immunoglobulines d'origine *animale* (chevaline) reçoit à nouveau des immunoglobulines d'origine animale (chevaline), il y a un risque accru de réaction allergique.

Anatoxine tétanique:

- Administrer 0,5 ml en intramusculaire

L'anatoxine tétanique existe en plusieurs présentations:

DTC: vaccin utilisé chez l'enfant de moins de 7 ans contenant les anatoxines diphtérique et tétanique et le vaccin contre la coqueluche.

DtaC: similaire au vaccin précédent, excepté que le composant contre la coqueluche est acellulaire.

DT: Anatoxines diphtérique et tétanique pour les enfants de moins de 7 ans.

Td: Anatoxines diphtérique et tétanique pour les adultes et enfants de plus de 7 ans.



INDICATIONS POUR L'ADMINISTRATION DES IMMUNOGLOBULINES ANTI-TÉTANIQUES ET DE L'ANATOXINE TÉTANIQUE:

Doses antérieures d'anatoxine tétanique	Blessures superficielles et propres		Blessures profondes et souillées	
	Anatoxine tétanique (vaccin)	Immunoglobulines tétaniques (sérum)	Anatoxine tétanique (vaccin)	Immunoglobulines tétaniques (sérum)
Nombre incertain ou inférieur à 3	Oui	Non	Oui	Oui
3 doses ou plus	Non	Non	Non	Non

STOCKAGE ET TRANSPORT:

Aussi bien les vaccins que les immunoglobulines doivent être transportés, stockés et maintenus jusqu'au moment de leur utilisation en conditions de réfrigération (entre 2 et 8 degrés centigrades au dessus de zéro). **Ils ne doivent pas être congelés.**

NOTE:

CES INSTRUCTIONS S'APPLIQUENT À L'ADMINISTRATION DE L'ANATOXINE TÉTANIQUE LÀ OÙ SONT PRISES EN CHARGE LES PERSONNES AYANT DES BLESSURES ET OÙ SONT RÉALISÉES DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES.

ELLES NE S'APPLIQUENT PAS AUX CAMPAGNES DE VACCINATION NI À LA VACCINATION DE ROUTINE.