

Recomendaciones del Grupo Técnico Asesor en Inmunizaciones de OPS sobre la vacuna VPH

Lúcia De Oliveira, PhD, MSc

Asesora Regional de Inmunización
Unidad de Inmunización Integral de la Familia/FPL

Tópicos principales

- Posición de la OMS en el 2017
- Recomendaciones GTA sobre la vacuna VPH:
 - 2019

Posición de la OMS sobre la vacuna VPH

(WER Mayo, 2017)

2017, 92, 241–268

No 19



World Health Organization

Organisation mondiale de la Santé

Weekly epidemiological record
Relevé épidémiologique hebdomadaire

12 MAY 2017, 92th YEAR / 12 MAI 2017, 92^e ANNÉE

No 19, 2017, 92, 241–268

<http://www.who.int/wer>

Contents

241 Human papillomavirus
vaccines: WHO position paper,
May 2017

Sommaire

241 Vaccins contre
les papillomavirus humains:
note de synthèse de l'OMS,
mai 2017

Human papillomavirus vaccines: WHO position paper, May 2017

Introduction

In accordance with its mandate to provide guidance to Member States on health policy matters, WHO issues a series of regularly updated position papers on vaccines and vaccine combinations against diseases that have an international public health impact. These papers are concerned primarily with the use of vaccines in large-scale immunization programmes. They summarize essential background

- Captar la población **prioritaria: niñas 9-14 años**, antes de extender la vacuna a otros grupos de edad o varones
- **2 dosis** (6 meses de intervalo)
- Si < 5 meses, dar otra dosis 6 meses después de la primera
- No hay **intervalo máximo** (sugiere no más de 12-15 meses)

Posición de la OMS sobre la Vacuna VPH

(WER Mayo, 2017)

2017, 92, 241–268

No 19



World Health Organization

Organisation mondiale de la Santé

Weekly epidemiological record
Relevé épidémiologique hebdomadaire

12 MAY 2017, 92nd YEAR / 12 MAI 2017, 92^e ANNÉE

No 19, 2017, 92, 241–268



Endosado por el GTA 2017

Contents

241 Human papillomavirus vaccines: WHO position paper, May 2017

Sommaire

241 Vaccins contre les papillomavirus humains: note de synthèse de l'OMS, mai 2017

Policy makers, who develop or endorse regularly updated position papers on vaccines and vaccine combinations against diseases that have an international public health impact. These papers are concerned primarily with the use of vaccines in large-scale immunization programmes. They summarize essential background

- Si < 5 meses, dar otra dosis 6 meses después de la primera
- No hay intervalo máximo (sugiere no más de 12-15 meses)

Recomendaciones GTA 2019



- El GTA manifiesta profunda preocupación sobre el suministro de la vacuna VPH y refuerza la importancia de atender las necesidades de los países para lograr reducir el cáncer cérvico uterino.
- Hace un llamado a la comunidad internacional para incitar a los fabricantes a ser operacionalmente y éticamente responsables por el suministro global de la vacuna y aliñarse al llamado de OPS para la eliminación del cáncer cervical.

Recomendaciones GTA 2019



- Tomando en cuenta los desafíos cuanto al suministro de la vacuna, todos los países que administran la vacuna VPH para niñas y niños deben **priorizar vacunar las niñas, alcanzando altas coberturas >80%. Eso va a inducir la inmunidad de rebaño y proteger niñas y niños.**
- El GTA incita a los países implementar la estrategia de vacunación en escuelas y tener planes de comunicación para acelerar la aceptación de la vacuna y maximizar su impacto.

**DON'T LET
CERVICAL CANCER
STOP YOU!**

**GET
VACCINATED**

**GET
SCREENED**



IT'S TIME TO END CERVICAL CANCER



WWW.PAHO.ORG/FIN-CANCER-CERVICAL

**¡MUCHAS
GRACIAS!**



OPS