

Uruguay

Los datos que alimentan el sistema de vigilancia epidemiológica de la influenza, Ministerio de Salud Pública (MSP) durante el año 2000 proceden de: (i) la notificación espontánea; (ii) la vigilancia de ausentismo laboral y (iii) de puestos centinelas. La notificación espontánea proviene de los centros públicos y privados del interior y la capital del país que notifican los casos de gripe con periodicidad semanal como corresponde a las enfermedades del grupo B de la lista de enfermedades de notificación obligatoria.

Durante el año 2000 se ha verificado una disminución de los casos notificados (2.133 casos) respecto a la mediana del periodo 1995 – 1999 (5.784 casos). Se observa un aumento estacional discreto en los meses de mayo y agosto, pero, muy por debajo de la mediana mensual correspondiente. Los datos de gripe se procesan por semana epidemiológica recién a partir de 1996, razón por la cual no se ha podido calcular la mediana semanal.

En la vigilancia del ausentismo laboral, los datos son aportados por el departamento de certificaciones médicas de establecimientos públicos, cubriendo una población de 28.000 personas. Con periodicidad semanal se remiten al departamento de Vigilancia Epidemiológica del MSP, los datos sobre el número total de funcionarios ausentes y entre ellos los que corresponden a “influenza no clasificada”.

Con relación a los puestos centinelas y analizando las metas propuestas para el año 2000 se puede observar. aumento del número de puestos centinelas, de 4 a 5; ii. aumento del número de muestras recogidas, esta meta no pudo ser cumplida ya que hubo una disminución del 27%, hecho que podría originarse en la disminución de consultas por influenza; iii. Disminución del porcentaje de muestras contaminadas, que bajo del 25% en 1999 a 10.8% en el 2000, debido al cambio de metodología utilizada; sustitución del exudado faríngeo por el nasal y disminución del intervalo entre la extracción y la entrega de muestras al laboratorio; iv. aumento del número de cepas enviadas al C.D.C, 4 en total de influenza A caracterizadas como similares a Nueva Caledonia/20/99 (H1N1). Las cepas de influenza B no pudieron ser caracterizadas por dificultades en la propagación de los cultivos celulares.

El MSP suministró en forma gratuita 300.000 dosis de vacuna anti-influenza al grupo etareo de mayores de 60 años en abril del 2000. Además distintas empresas vacunaron a sus empleados y seguros privados de salud ofrecieron vacunas a sus usuarios.