

ELIMINACIÓN DE LA RUBÉOLA Y DEL SÍNDROME DE RUBÉOLA CONGÉNITO

Plan de Acción

Paraguay – 2004/2010

Antecedentes

- **607 casos sospechosos de rubéola notificados entre 1998 y 2003**
- **211 fueron confirmados por laboratorio**
- **47 a 68% de los casos se concentra en el grupo de menores de 5 años y 35 a 61% se presenta en el grupo de 5 a 40 años**
- **Entre los casos confirmados por laboratorio, la mayor proporción se presenta en el grupo mayor de 5 años**

Paraguay incluyó vacuna contra rubéola en el programa regular de vacunación a mediados del 2002

Gráfico 1. Incidencia de Rubéola adquirida según grupos de edad Paraguay – 1998/2002





Gráfico 2. Casos notificados de rubéola en MEF Paraguay – 1998/2002



SRC: Magnitud del problema

- **No existe un sistema de vigilancia para el SRC**
- **Propuesta “Modelo de vigilancia a nivel nacional con énfasis en hospitales de segundo y tercer nivel”**
- **Parte integrante del sistema de vigilancia de las enfermedades prevenibles por vacunación**

Objetivos Generales

- 1. Interrumpir la circulación del virus de la rubéola en Paraguay**
- 2. Prevenir la aparición del Síndrome de Rubéola Congénito- SRC-**
- 3. Disminuir los costos asociados con el tratamiento y rehabilitación de niños con SRC en Paraguay**
- 4. Consolidar la erradicación del sarampión**

Objetivos Específicos

- 1. Mantener la vacuna SPR en el esquema oficial de vacunación**
- 2. Establecer en el 2005 el refuerzo con SPR a los 4 años de edad**
- 3. Fortalecer la vigilancia integrada del Sarampión y la Rubéola**
- 4. Implementar a partir del 2004 el sistema de vigilancia epidemiológica del SRC**
- 5. Realizar en el 2005 una campaña masiva de vacunación a población de hombres y mujeres de 5 a 39 años de edad de todo el país**
- 6. Vacunar en el post- parto y post- aborto inmediato con SR a todas las mujeres no vacunadas contra sarampión y la rubéola**

Metas

- **Vacunar en el 2005 a hombres y mujeres de 5 a 39 años de edad con una dosis de vacuna SR**
- **Implementar el sistema de vigilancia de SRC en los hospitales Centinelas en el 2004**
- **Efectivizar el refuerzo de SPR a los 4 años de edad en el esquema de vacunación regular**

Ámbito y Duración

Ámbito: Comprenderá los 230 distritos que conforman el territorio nacional

Duración: 2004- 2010

Estrategias

- **Introducción del Plan en la agenda política**
- **Movilización de recursos**
- **Capacitación**
- **Campaña masiva de vacunación**
- **Movilización social**
- **Vigilancia y control de brotes**
- **Apoyo del laboratorio para la vigilancia**
- **Identificación de necesidades de investigación**
- **Evaluación del Plan**

Organización y Administración

