



Ministerio de
Salud Pública

**IMPACTO DE LA VACUNACIÓN DE LA
RUBÉOLA EN LA EPIDEMIOLOGÍA DE
LA RUBÉOLA Y EL SRC .
URUGUAY .
1963 – 2003.**

DISTRIBUCION DE CASOS DE RUBEOLA SEGÚN AÑO. URUGUAY. 1963 – 2003.



DISTRIBUCION DE LAS TASAS DE MORBILIDAD DE LA RUBEOLA SEGÚN AÑO. 1963 – 2003. URUGUAY




NO SE PRODUJERON LOS BROTES ESPERADOS EN LOS AÑOS 1982, 1988, 1994 Y 2000, COMO ERA DE ESPERAR SEGÚN LA TENDENCIA EPIDÉMICA PREVIA A LA INMUNIZACIÓN.

EN EL AÑO 1982 SE INTRODUCE LA VACUNACIÓN CON SRP A LA POBLACIÓN INFANTIL (NIÑAS Y VARONES), ALCANZANDO COBERTURAS IGUALES O SUPERIORES AL 95% CASI TODOS LOS AÑOS.

EN 1992 SE INTRODUCE UNA SEGUNDA DOSIS A LOS 5 AÑOS DE EDAD.

DISTRIBUCION DE CASOS DE RUBEOLA Y COBERTURA DE SRP. 1963 – 2003. URUGUAY.



Ministerio de
Salud Pública

SEGÚN EL PROF. SALVERAGLIO EN SU PUBLICACIÓN
“INMUNIZACIONES EN EL HOMBRE” (AÑO 1982)

“LA EPIDEMIA DE RUBÉOLA EN NUESTRO PAÍS EN LOS
AÑOS 1967 A 1976 FUE DE LAS MÁS EXTENDIDAS QUE
SE CONOCEN.

NO SE DISPONE DE DATOS DE CASOS DE
MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE ESAS FECHAS”.



EN URUGUAY EN 1968 SE REALIZÓ EN ZONAS SUBURBANAS Y RURALES, LA PRUEBA DE INHIBICIÓN DE HEMAGLUTINACIÓN A MUJERES MAYORES DE 15 AÑOS, DANDO UN PORCENTAJE DE 15% DE SERONEGATIVIDAD DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA.

(DOWLE ET AL. WHO COLLABORATIVE STUDY ON THE SERO EPIDEMIOLOGY OF RUBELLA IN CARIBBEAN AND MIDDLE AND SOUTH AMERICAN POPULATIONS IN 1968. BULLETIN OF THE WHO.1970).

SI BIEN SE DISCUTE EN DICHA PUBLICACIÓN, COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DEL SRC LA VACUNACIÓN MASIVA SOLO DE NIÑOS, EN EL URUGUAY LA MEDIDA ESTÁ EN PRACTICA DESDE 1982.

HAY POR LO TANTO 21 COHORTES VACUNADAS HASTA EL 2003, LO QUE DETERMINÓ LAS BAJAS TASAS DE PREVALENCIA DE LA RUBÉOLA EN LA POBLACIÓN GENERAL. (2001 0,02/100.00 HAB, 2002 Y 2003 0/100.000 HAB).

LA NO OCURRENCIA DE CASOS DE SRC DEBE
SER DEMOSTRADA CIENTÍFICAMENTE A TRAVÉS
DE ESTUDIOS SEROEPIDEMIOLÓGICOS EN LAS
MUJERES EMBARAZADAS.



SE PRESENTO A LA UNIDAD DE INMUNIZACION DE OPS UN PREPROYECTO DE INVESTIGACION PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE PREVALENCIA, A FIN DE DEMOSTRAR LA PREVALENCIA DE ANTICUERPOS DE RUBEOLA EN LAS MEF Y ADOLESCENTES FEMENINAS.

SE PLANTEABA TRABAJAR CON UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE ELLAS.

LAS VARIABLES A DETERMINAR SERIAN LA SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS Y LAS VARIABLES EPIDEMIOLOGICAS DE PERSONA, LUGAR Y TIEMPO.